

01 – A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, regulando para todo o território nacional as ações e os serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas de direito público ou privado. Considerando o Sistema Único de Saúde (SUS), incluído no citado dispositivo legal, assinale o que for correto.

- 01) Mesmo em caráter complementar a iniciativa privada não poderá participar do SUS.
- 02) O SUS é constituído de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público.
- 04) A direção do SUS é única, sendo exercida na União, pelo Ministério da Saúde, nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, pelas respectivas Secretarias da Saúde ou órgãos equivalentes.
- 08) A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano constam do campo de atuação do SUS.
- 16) O SUS, no nível municipal, poderá ser organizado em distritos, com o propósito da integração de recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.

02 – Quanto às competências da direção municipal do SUS, assinale o que for correto.

- 01) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.
- 02) Participar do planejamento, da programação e da organização da rede regionalizada e hierarquizada do SUS, em articulação com sua direção estadual.
- 04) Fica vedada a participação do SUS no controle e na fiscalização dos procedimentos dos serviços privados de saúde.
- 08) Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar junto aos órgãos municipais e estaduais para controlá-las.
- 16) Participar da execução, do controle e da avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho.

03 – As ações de saúde pública no Brasil devem estar voltadas, ao mesmo tempo, para o indivíduo e para a comunidade, para a prevenção e para o tratamento, sempre respeitando a dignidade humana. Nesse contexto e no que se refere aos princípios, definidos em lei, que embasam essas ações, assinale o que for correto.

- 01) Universalidade de acesso.
- 02) Não hierarquização da rede de serviços.
- 04) Integralidade de assistência.
- 08) Ênfase na centralização dos serviços.
- 16) Descentralização político-administrativa.

04 – A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, alterou dispositivos da Constituição Federal relacionados em destaque para o setor de saúde, para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e dos serviços públicos de saúde. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) A Emenda Constitucional nº 29/2000 alterou dispositivos constitucionais para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações públicas da saúde.
- 02) A Emenda Constitucional nº 29/2000 alterou dispositivos constitucionais para assegurar os recursos mínimos para o financiamento dos serviços públicos da saúde.
- 04) Pela Emenda Constitucional nº 29/2000 o Estado poderá intervir no Município que não aplicar o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e no desenvolvimento do ensino e/ou nas ações e nos serviços de saúde.
- 08) Pela Emenda Constitucional nº 29/2000 as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, deverão ser estabelecidas por Lei Complementar, mediante avaliação a ser feita anualmente.
- 16) Pela Emenda Constitucional nº 29/2000 a União poderá intervir no Estado, ou no Distrito Federal, quando não ocorrer a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino e/ou nas ações e no serviços de saúde.

05 – A Norma Operacional Básica nº 01/91 do Sistema Único de Saúde (NOB-SUS 01/91) teve por objetivo fornecer as primeiras instruções aos responsáveis pela implantação e operacionalização do Sistema Único de Saúde, estabelecendo os aspectos de natureza operacional e os intrinsecamente necessários ao gerenciamento dos serviços e das ações de saúde, como também do controle, do acompanhamento e da fiscalização da aplicação de recursos.

- 01) A NOB-SUS 01/91 estabeleceu a constituição dos Conselhos de Saúde, para funcionamento em caráter permanente e deliberativo, com representação paritária e compostos por representantes dos governos, dos prestadores de serviços e dos profissionais de saúde (50%) e usuários (50%), para atuação na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
- 02) A NOB-SUS 01/91 estabeleceu a linha básica dos Fundos de Saúde, de natureza contábil e financeira, vinculados aos objetivos do SUS e detentores de prévia autorização pelo legislativo para aplicação de suas receitas através de dotação consignada na Lei de Orçamento ou em crédito adicional.
- 04) Os Fundos de Saúde referidos na NOB-SUS 01/91 constaram como de gerência pelo órgão de saúde da esfera correspondente e fiscalizados pelo Conselho de Saúde respectivo.
- 08) O Relatório de Gestão ficou estabelecido na NOB-SUS 01/91 como requisito básico para a transferência automática de recursos aos Municípios, devendo ser elaborado com a abordagem dos seguintes aspectos: finalidades especiais, plano de trabalho elaborado, plano de trabalho executado e resultados alcançados.
- 16) A NOB-SUS 01/91 estabeleceu que a avaliação técnica e financeira do SUS em todo o Território Nacional seria efetuada e coordenada pelo Ministério da Saúde e INAMPS, em cooperação técnica com os Estados, Distrito Federal e Municípios.

06 – Sobre os mediadores químicos envolvidos na fisiopatologia da rinite alérgica, assinale o que for correto.

- 01) A interleucina 5 (IL-5) tem papel importante na manutenção da inflamação eosinofílica porque inibe mecanismos de apoptose celular dos eosinófilos.
- 02) Os eosinófilos liberam proteína básica principal, proteína eosinofílica catiônica e leucotrienos C4 quando atingem os tecidos.
- 04) Dá-se início à inflamação alérgica no momento em que uma molécula exógena é inalada e se deposita sobre a mucosa nasal.
- 08) A ligação da IgE com os seus receptores gera a liberação de mediadores que são responsáveis pelos sintomas de congestão nasal, rinorreia, prurido e espirros.
- 16) Durante a fase imediata da resposta alérgica, a produção de IL-9 e IL-13 induz o linfócito B a diferenciar-se em plasmócito e produzir IgE específica ao antígeno que deu início ao processo.

07 – Assinale o que for correto no que se refere à polipose nasossinusal.

- 01) A prevalência na população geral é considerada alta, sendo mais comum em adultos que em crianças.
- 02) Atinge principalmente as raças caucasiana e negra.
- 04) A incidência é maior em homens que em mulheres e aumenta significativamente após os 40 anos.
- 08) Ocorre mais raramente em subgrupos de pacientes com asma e intolerância ao ácido acetilsalicílico.
- 16) A associação da cirurgia funcional nasal e tratamento clínico com corticóide tópico nasal é frequentemente usada no tratamento da polipose nasossinusal.

08 – Paciente com perda auditiva unilateral lentamente progressiva, acompanhada de zumbido e episódios de desequilíbrio (sem crises vertiginosas), há 2 anos. Nesse caso, assinale o que for correto no que se refere à principal hipótese diagnóstica.

- 01) Doença de Menière.
- 02) Schwannoma vestibular.
- 04) Neurite vestibular.
- 08) Vertigem posicional paroxística benigna.
- 16) Vertigem de origem metabólica.

09 – Em relação à anatomia do nariz, assinale o que for correto.

- 01) As conchas nasais delimitam espaços na parede lateral do nariz chamados meatos nasais.
- 02) O septo nasal é formado quase exclusivamente pelo osso vômer.
- 04) A parede lateral do nariz é formada apenas pelos ossos lacrimal, etmoide e esferoide.
- 08) Externamente, o nariz é formado por uma parte óssea e dois pares de cartilagens que não tem relação com o septo nasal.
- 16) As conchas fazem parte da parede lateral do nariz, sendo a superior e a média parte do osso etmoide, e a inferior um osso isolado.

10 – Em relação à resistência que o ar encontra na via aérea, durante a inspiração, assinale o que for correto.

- 01) O nariz é responsável por cerca de 2/3 da resistência total da via aérea.
- 02) O reflexo vasomotor nasal interfere na resistência da via aérea, especialmente na resistência nasal.
- 04) O nariz é responsável por cerca de 20% da resistência total da via aérea.
- 08) O ponto de maior resistência em toda via aérea é a válvula nasal.
- 16) A cavidade oral, na respiração oral exclusiva, é responsável por cerca de 60% da resistência total da via aérea.

11 – No que se refere aos fatores predisponentes para otite externa difusa, assinale o que for correto.

- 01) Utilização de cotonoides.
- 02) Perfuração de membrana timpânica.
- 04) Prática de natação.
- 08) Utilização de prótese auditiva.
- 16) Eczema do conduto auditivo externo.

12 – Sobre o diagnóstico radiológico das rinossinusites, assinale o que for correto.

- 01) A tomografia computadorizada deve ser realizada nos casos com indicação cirúrgica e não é indicada em quadros agudos que não estejam evoluindo bem, apesar de um adequado tratamento clínico.
- 02) A tomografia computadorizada é considerada padrão ouro para a avaliação radiológica dos seios paranasais.
- 04) As variações anatômicas que mais frequentemente podem estar associadas à rinossinusite crônica ou recorrente são, entre outras: desvio septal causando obstrução do meato médio, pneumatização exuberante das células do *agge nasí*, concha média bolhosa, concha média paradoxal, processo uniforme pneumatizado e célula de Haller.
- 08) A ressonância magnética é o melhor método para avaliação dos seios paranasais, no entanto, pelo seu elevado custo, é reservada para casos especiais.
- 16) A tomografia computadorizada está indicada em casos de história clínica compatível com rinossinusite crônica, recorrente ou suas complicações.

13 – Em relação ao crescimento dento facial e à obstrução nasal na criança, assinale o que for correto.

- 01) A presença de mais uma apneia obstrutiva por hora na criança é considerada patológica.
- 02) Alterações oclusais, como mordida aberta e/ou cruzada, podem estar presentes.
- 04) O maior crescimento do esqueleto facial coincide com o período de maior crescimento do tecido linfóide de Waldeyer.
- 08) A criança com respiração oral crônica tende a apresentar hipoplasia maxilar e prognatismo mandibular.
- 16) Hiperatividade e irritabilidade podem ser consequências da má qualidade do sono.

14 – No que se refere aos fatores relacionados com a otite média secretora, assinale o que for correto.

- 01) Infecção do conduto auditivo externo.
- 02) Imunodeficiência.
- 04) Tumor de rinofaringe.
- 08) Infecção das vias aéreas superiores.
- 16) Otite média aguda tratada inadequadamente.

15 – Assinale o tipo de perda auditiva provocada pela otospongiose (otosclerose).

- 01) Apenas neurosensorial.
- 02) Neurosensorial flutuante.
- 04) Apenas condutiva.
- 08) Neurosensorial e condutiva.
- 16) Condutiva flutuante.

16 – Em relação aos nódulos de pregas vocais, assinale o que for correto.

- 01) São lesões de massa, simétricas, bilaterais, esbranquiçadas ou levemente avermelhadas.
- 02) São lesões que se desenvolvem na região anterior das pregas vocais, na metade da área de maior vibração glótica.
- 04) São lesões benignas.
- 08) São lesões decorrentes essencialmente do abuso vocal.
- 16) São lesões muito comuns em homens adultos.

17 – Lactente de 10 semanas de vida, sem queixas anteriores ou infecção das vias aéreas superiores prévia, com estridor, principalmente inspiratório, que piora com o choro e com a posição supina e melhora com a extensão cervical. Nesse contexto, assinale o que for correto no que se refere à hipótese diagnóstica.

- 01) Paralisia das pregas vocais.
- 02) Estenose subglótica.
- 04) Hemangioma subglótico.
- 08) Corpo estranho.
- 16) Laringomalacia.

18 – Lactente de 10 semanas de vida, sem queixas anteriores ou infecção das vias aéreas superiores prévia, com estridor, principalmente inspiratório, que piora com o choro e com a posição supina e melhora com a extensão cervical. Nesse contexto, assinale o que for correto no que se refere ao melhor exame para a confirmação diagnóstica.

- 01) Broncoscopia.
- 02) Laringoscopia direta + biópsia.
- 04) Fibrolaringoscopia.
- 08) Eletromiografia.
- 16) Angiografia.

19 – Assinale o que for correto no que se refere às massas cervicais congênitas medianas.

- 01) Cisto do ducto tireoglosso.
- 02) Laringocele.
- 04) Cisto dermoide.
- 08) Ranula.
- 16) Cisto tímico.

20 – No que se refere às complicações da otite média crônica, assinale o que for correto.

- 01) Meningite.
- 02) Paralisia facial periférica.
- 04) Otite externa supurativa.
- 08) Fistula labiríntica.
- 16) Empiema subdural.