

01 – Na administração de alimentação intermitente ou contínua por meio de um cateter enteral, alguns cuidados são importantes. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) Depois de administrar a quantidade prescrita da solução, lavar o cateter com água para não aumentar o volume final.
- 02) Lavar as mãos.
- 04) Manter a cabeceira do leito elevada.
- 08) Após completada a alimentação intermitente e realizados os cuidados necessários, tampar a extremidade do cateter com sua própria tampinha ou pinçar.
- 16) Devem ser monitorados sons respiratórios, sons intestinais, distensão gástrica, constipação ou diarreia.

02 – As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são infecções causadas por uma grande variedade de bactérias, vírus, protozoários e ectoparasitas. As DSTs constituem a causa direta de terrível sofrimento humano, provocando uma grande demanda nos serviços de saúde. O cuidado da mulher infectada focaliza tanto as necessidades físicas quanto as psicológicas e cabe ao profissional de enfermagem orientá-la para realizar o autocuidado. Nesse contexto, assinale o que correto.

- 01) Tomar a medicação conforme prescrito e usar medidas de conforto para aliviar os sintomas.
- 02) Ao retomar as relações sexuais, atentar para a higiene íntima e frequência dos atos sexuais.
- 04) Abster-se de relações sexuais até que o tratamento esteja completo e usar práticas seguras de sexo quando retornar às relações sexuais.
- 08) Comparecer à consulta somente quando apresentar lesões e erupções com corrimento.
- 16) Algumas DSTs podem também ser transmitidas por vias não sexuais, porém as formas de transmissão pelo contato sexual são mais frequentes.

03 – Segundo o Programa Nacional de Imunização (PNI), as vacinas de bactérias atenuadas, em princípio, não devem ser administradas em pessoas. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) Com imunodeficiência congênita ou adquirida.
- 02) Acometidas de neoplasia maligna.
- 04) Alérgicas ao leite e seus derivados (intolerância à lactose).
- 08) Submetidas à terapêuticas imunossupressoras (quimioterapia antineoplásica, radioterapia etc.).
- 16) Em tratamento com corticosteróide em dose alta por mais de duas semanas.

04 – No que respeita à administração de medicamentos por via parenteral, assinale o que for correto.

- 01) A via de administração intramuscular é indicada para medicamentos irritantes por ser menos dolorosa devido à existência de número menor de terminações nervosas no tecido muscular profundo.
- 02) A injeção subcutânea é utilizada para fazer testes alérgicos e de hipersensibilidade.
- 04) A aplicação de insulina intradérmica garante que sua absorção seja rápida.
- 08) A via intradérmica é indicada para a administração da vacina BCG.
- 16) Na administração da medicação parenteral, a velocidade não é importante e sim a prescrição.

05 – A dispnéia surge como consequência de condições ambientais, trauma e doenças clínicas. Nesse contexto, assinale o que for correto no que se refere aos cuidados no atendimento de emergência pré-hospitalar.

- 01) Manter abertura de vias aéreas.
- 02) Elevar membros inferiores em mais ou menos 20 centímetros.
- 04) Não dar nada para a vítima comer ou beber.
- 08) Manter a vítima em decúbito dorsal.
- 16) Transportar a vítima com cabeceira elevada em 45°, exceto em caso de trauma.

06 – No que respeita ao cidadão de 50 anos, casado e pai de cinco filhos, que foi admitido em uma clínica cirúrgica de um hospital para realizar uma laparotomia exploratória, assinale o que for correto no que se refere às orientações transmitidas pelo enfermeiro ao paciente no período pré-operatório, para serem seguidas no período pós-operatório.

- 01) Fazer exercício respiratório, deambulação precoce, exercícios de flexão e extensão para pernas e pés.
- 02) Observar o nível de ansiedade, detectar sudorese, taquicardia, insônia e hipertensão.
- 04) Informar sobre a presença de dor, sangramento, náuseas ou vômitos e sinais de retenção urinária.
- 08) Remover próteses dentárias, evitar enfisema pulmonar e administrar O₂.
- 16) Avaliar o hábito intestinal e observar a presença de depressão respiratória.

07 – No que respeita aos cuidados no tratamento de feridas, assinale o que for correto.

- 01) Usar soro fisiológico morno para limpeza em jato.
- 02) Todo material que vai ficar em contato direto com o paciente deve ser esterilizado.
- 04) As mãos devem ser lavadas antes e após o tratamento.
- 08) Todo material é considerado contaminado ao entrar em contato com qualquer objeto não esterilizado.
- 16) O material esterilizado deve ficar em recipiente próprio e só deve ser retirado com auxílio de pinça ou luva estéril.

08 – No que respeita aos sinais vitais e instrumentos para sua medição, assinale o que for correto.

- 01) Os termômetros de mercúrio, feitos de vidro, devem ser segurados ao nível dos olhos para a sua correta leitura.
- 02) A pressão sistólica e a pressão diastólica podem ser estimadas, com precisão, a partir do método palpatório da pressão arterial.
- 04) Os sintomas esperados na hipotensão ortostática são tonteira, fraqueza e turvação da visão, podendo o paciente apresentar, até mesmo, síncope.
- 08) Se, no momento da verificação da pressão arterial, o braço do paciente ficar abaixo do nível do coração, haverá erro na medida.
- 16) As frequências respiratórias anormais incluem taquipneia, bradipneia e apneia.

09 – A contaminação do paciente por microrganismos pode ser evitada por meio de vários procedimentos. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) Assepsia é o conjunto de meios utilizados para impedir a contaminação microbiana.
- 02) Antissepsia é o conjunto de meios utilizados para impedir a multiplicação bacteriana em tecidos mortos.
- 04) Descontaminação é a destruição de formas vegetativas microbianas esporuladas.
- 08) Higienização é todo processo de limpeza que visa remover resíduos e reduzir microrganismos a níveis recomendados pelos códigos sanitários.
- 16) Esterilização é a destruição de todas as formas de microrganismos, exceto esporos.

10 – No que respeita à doença hipertensiva específica da gravidez, assinale o que for correto.

- 01) Frequentemente, essa doença surge antes da 20ª semana de gravidez, desaparecendo até seis semanas após o parto.
- 02) As alterações renais são percebidas através da proteinúria, da diminuição do fluxo plasmático e da filtração glomerular e do aumento da creatinina.
- 04) De acordo com o Consenso Brasileiro de Cardiopatia e Gravidez, caracteriza-se HAS na gravidez, quando a pressão arterial estiver maior do que 140x90 mmHg, em duas tomadas com intervalo de 4 horas, em repouso, ou quando houver aumento maior que 30 mmHg na PAS.
- 08) Lesões no tecido cerebral decorrentes de hemorragia difusa são, muitas vezes, causa de convulsões, por isso, na pré-eclâmpsia grave, a paciente deve ficar em quarto isolado, de repouso no leito, exposta ao mínimo de ruídos possível.
- 16) O sofrimento fetal decorre do aumento da pressão dos fluidos, que gera vasodilatação, diminuição da frequência cardíaca materna e modificações no ritmo cardíaco fetal.

11 – Na assistência de enfermagem, ao se referir a sinais e sintomas apresentados pelos pacientes, o profissional se utiliza de vários termos técnicos. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) Cefalalgia é a dor de cabeça intensa e prolongada.
- 02) Poliúria é o aumento do volume urinário.
- 04) Hiperemese significa presença de vômitos contínuos, incoercíveis ou excessivos.
- 08) Afasia é o termo utilizado para a incapacidade de deglutir.
- 16) Assistolia é a diminuição da contração uterina.

12 – No que respeita à administração de medicamentos, assinale o que for correto.

- 01) Para a enfermagem, a via parenteral consiste na injeção de medicamentos nas vias intramuscular, endovenosa, auricular, intradérmica ou subcutânea.
- 02) Indica-se a via parenteral para a administração de medicamentos em casos de paciente inconsciente, com distúrbio gastrointestinal ou impossibilitado de deglutir.
- 04) Ao se utilizar a via subcutânea para administrar medicamento, não se deve aplicá-lo nas proximidades da cintura pélvica ou das articulações e na região genital.
- 08) Certas vacinas, como a antirábica, ou drogas como insulina, adrenalina e heparina, têm indicação para aplicação por via subcutânea, também chamada hipodérmica.
- 16) A via subcutânea é indicada para drogas irritantes ou quando se quer obter absorção ou ação imediata do medicamento.

13 – Apesar dos recursos disponíveis no Brasil em relação ao controle de câncer de colo de útero, a mortalidade pouco reduziu nos últimos anos. Nesse contexto, assinale o que for correto no que se refere aos fatores de risco.

- 01) A faixa etária de maior risco concentra-se entre 40 e 60 anos.
- 02) O principal é a infecção pelo vírus do Papiloma Humano.
- 04) A condição social não influi na distribuição da doença.
- 08) O uso de contraceptivos orais é um fator de risco.
- 16) As doenças sexualmente transmissíveis não são consideradas fator de risco.

14 – No que respeita à vigilância epidemiológica, assinale o que for correto.

- 01) A presença de sinais e sintomas clínicos compatíveis com a infecção é suficiente para se considerar um caso confirmado de infecção hospitalar.
- 02) O método de vigilância dirigida das infecções hospitalares utiliza a estratégia de monitoramento apenas dos pacientes internados em determinados setores, por serviço específico e por sítio de infecção específico.
- 04) A cólera, os casos agudos de Doença de Chagas e a febre amarela são exemplos de doenças de notificação compulsória.
- 08) Deve-se suspeitar de um surto de infecção hospitalar quando, por meio da análise de dados coletados pelo sistema de vigilância de rotina, houver agrupamento de casos de infecções semelhantes em uma mesma unidade hospitalar ou entre pacientes semelhantes.
- 16) O método de coleta de dados a ser instituído em setores como berçários e unidades de tratamento intensivo deve ser o de busca ativa, com visitas diárias programadas.

15 – No que respeita às medidas de segurança na administração de medicamentos, assinale o que for correto.

- 01) Observação do prazo de validade, prescrição e horário de administração.
- 02) Via de administração, conforme o medicamento prescrito.
- 04) Experimentação frequente das drogas, para verificar mudanças no paladar.
- 08) Permanência do frasco, na cabeceira do doente, para seu uso exclusivo.
- 16) Conhecimento da fórmula do medicamento.

16 – No que se refere às complicações comuns apresentadas por pacientes cirúrgicos na sala de recuperação pós-anestésica, assinale o que for correto.

- 01) Arritmia.
- 02) Hipotermia.
- 04) Bradicardia.
- 08) Hipóxia.
- 16) Infecção.

17 – De acordo com a terminologia utilizada na enfermagem, assinale o que for correto.

- 01) Limpeza ou higiene é o asseio ou retirada da sujidade de qualquer superfície.
- 02) Desinfecção é o processo físico ou químico que destrói todos os tipos de microorganismos.
- 04) Artigos, compreendem instrumentos de natureza diversa: utensílios (talheres, comadres etc.), acessórios de equipamentos e outros.
- 08) Monitorização, significa controlar a rotina operacional por meio de indicadores de eficiência do processo, certificando-se de que as especificações validadas para o processo estão sendo mantidas dentro do padrão estabelecido.
- 16) Os equipamentos de Proteção Individual (EPI) compõem-se de óculos, máscaras, botas, luvas, avental e protetor para ruídos.

18 – Em relação aos riscos biológicos para profissionais de enfermagem durante a realização de procedimentos terapêuticos e diagnósticos, assinale o que for correto.

- 01) O risco de transmissão de Hepatite C é maior nos acidentes envolvendo exposição a outros materiais biológicos que não o sangue humano.
- 02) O contato com secreções vaginais está envolvido habitualmente nas situações de risco ocupacional para profissionais de saúde.
- 04) O risco de transmissão do vírus da Hepatite B em profissionais de saúde no ambiente de trabalho depende de alguns fatores, como, o grau de exposição ao sangue no ambiente de trabalho e também à presença ou não do antígeno HBeAg no paciente-fonte.
- 08) As exposições percutâneas são responsáveis por uma minoria dos casos ocupacionais de Hepatite B.
- 16) Precauções-padrão são medidas normatizadas que visam reduzir a exposição aos materiais biológicos provenientes de pacientes com diagnóstico comprovado de doença infecciosa.

19 – A utilização de diferentes vias para a aplicação de injeção é justificada pelo objetivo que se quer alcançar com a substância utilizada e pelas características do paciente. Nesse contexto e em relação à administração de medicamentos por via parenteral, assinale o que for correto.

- 01) A via intramuscular é escolhida para a aplicação de injeção porque a substância injetada pode ser irritativa, volumosa, ou de difícil absorção.
- 02) Na aplicação de injeção, a região da face ântero-lateral da coxa é contraindicada para crianças menores de 28 dias, sendo indicada especialmente para lactentes e crianças até dez anos.
- 04) A aplicação de insulina subcutânea garante que sua absorção seja rápida.
- 08) A via intradérmica é apropriada para aplicação de vacinas ou para testes de sensibilidade.
- 16) As veias mais utilizadas para a aplicação de injeção endovenosa são as veias da dobra do cotovelo, a cefálica, a basílica, a mediana, as do antebraço e as do plexo venoso do dorso da mão.

20 – No que respeita ao atendimento de emergência da hipoglicemia, assinale o que for correto.

- 01) Deve-se realizar exame físico com atenção ao hálito cetótico.
- 02) Deve-se administrar açúcar em vítimas conscientes.
- 04) Não se deve oferecer nada por via oral em vítimas inconscientes.
- 08) A infusão venosa prescrita no Pronto-Socorro deve ser feita com insulina do tipo NPH humana.
- 16) Deve-se transportar a vítima em decúbito lateral em caso de vômito.