



**QUESTÕES REFERENTES A POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE E MODELOS DE ATENÇÃO À SAÚDE**

**01-** Sobre os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e das Redes de atenção à Saúde (RAS) na atenção básica, assinale o que for correto.

- 01) Universalidade.
- 02) Moralidade.
- 04) Equidade.
- 08) Integralidade.

**02-** Relacionado à Portaria nº 3.390, que institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale o que for correto.

- 01) Cabe ao hospital implantar os núcleos de Segurança do Paciente, de forma a elaborar um Plano de Segurança do Paciente, bem como garantir a implantação dos Protocolos Básicos de Segurança do Paciente.
- 02) Cabe ao hospital identificar e divulgar os profissionais que são responsáveis pelo cuidado do paciente nas unidades de internação, nos prontos socorros, nos ambulatórios de especialidades e nos demais serviços.
- 04) Cabe ao hospital implantar a visita aberta, de forma a garantir a ampliação do acesso dos visitantes ao pronto-socorro e às unidades de internação, favorecendo a relação entre o usuário, familiares e rede social de apoio e a equipe de referência.
- 08) Os usuários internados, especialmente os idosos, gestantes, crianças, adolescentes e indígenas, possuem direito a acompanhante 24 (vinte e quatro) horas por dia.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**03-** Sobre a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política de Atenção Básica no SUS, assinale o que for correto.

- 01) Como prioridade de atendimento na Atenção Básica será feita uma classificação baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras.
- 02) A Atenção Básica é a principal porta de entrada do sistema de saúde e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), que coordena o cuidado e ordena as ações e serviços disponibilizados na rede.
- 04) A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde.
- 08) A Atenção Básica será ofertada parcialmente e gratuitamente a algumas pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.

**04-** A governança federativa do SUS é composta, também, por espaços onde a sociedade atua na política de saúde nas três esferas de governo, que são os conselhos de saúde e as conferências de saúde. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) Os conselhos de saúde são espaços institucionais presentes em cada esfera de governo, voltados para formular estratégias e controlar a execução da política de saúde, incluindo as questões relativas aos aspectos econômicos e financeiros.
- 02) Além do Conselho Nacional e dos conselhos estaduais e municipais de saúde, exigidos pela legislação, há também conselhos regionais, locais e distritais, a exemplo dos conselhos dos distritos sanitários especiais indígenas. Esses últimos devem atuar sob a coordenação dos conselhos de saúde da esfera de governo correspondente.
- 04) Os conselhos de saúde estão compostos por representantes do governo, dos usuários, dos profissionais de saúde e dos prestadores de serviços. A representação dos usuários é paritária em relação ao conjunto dos demais setores que compõem o conselho, sendo 25% das vagas para os trabalhadores da saúde e 25% para os gestores e prestadores da saúde.
- 08) As conferências de saúde, realizadas uma vez por ano, ou num período menor, se conveniente, possuem um fundo de saúde que consiste na unidade orçamentária voltada para a gestão dos recursos destinados ao financiamento das ações e serviços de saúde, podendo ser públicos ou não.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**05-** Sobre algumas das Diretrizes do SUS e da Rede de Assistência de Saúde (RAS) a serem operacionalizadas na Atenção Básica, assinale o que for correto.

- 01) Territorialização e Adstrição: permite o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com foco em um território específico, com impacto na situação, nos condicionantes e determinantes da saúde das pessoas e coletividades que constituem aquele espaço e estão, portanto, adstritos a ele.
- 02) População Adscrita: população que está presente no território da UBS, de forma a estimular o desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado e com o objetivo de ser referência para o seu cuidado.
- 04) Longitudinalidade do cuidado: reforça a importância da Atenção Básica ser resolutiva, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínicas e sanitariamente efetivas, centrada na pessoa, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais.
- 08) Ordenar as redes: pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente, acompanhando os efeitos das intervenções em saúde e de outros elementos na vida das pessoas, evitando a perda de referências e diminuindo os riscos de iatrogenia que são decorrentes do desconhecimento das histórias de vida e da falta de coordenação do cuidado.

**06-** Sobre as doenças que estão na lista de agravos de notificação compulsória, assinale o que for correto.

- 01) Síndrome da paralisia flácida aguda.
- 02) Febre do Nilo.
- 04) Diabetes.
- 08) HIV/AIDS - Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**07-** O Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde possui um conjunto de três instrumentos avaliativos distintos. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) A observação que avalia uma característica própria e é através dela que informamos sobre o contexto em que estamos, para nele nos situarmos de forma satisfatória de acordo com normas e valores.
- 02) Questionário dirigido aos usuários avalia a satisfação do usuário para com a assistência recebida pelos estabelecimentos a serem avaliados.
- 04) Conjunto de indicadores, que avalia os resultados e corresponde a um conjunto variado de indicadores, construídos a partir dos vários bancos de dados ou sistemas de informação alimentados pelos estabelecimentos.
- 08) Roteiro de itens de verificação, que avalia basicamente os vários elementos da gestão e é composto por cinco blocos que, por sua vez, se subdividem em critérios ou tópicos.

**08-** Sobre os Princípios do planejamento governamental no SUS, assinale o que for correto.

- 01) As diretrizes estabelecidas por esse conjunto de normas podem ser elencadas em sete princípios gerais que orientam os gestores das três esferas da Federação.
- 02) O planejamento consiste em uma atividade obrigatória e contínua, deve ser integrado à Seguridade Social e ao planejamento governamental geral.
- 04) O planejamento deve estar articulado constantemente com o monitoramento, a avaliação e a gestão do SUS; o planejamento deve ser ascendente e integrado.
- 08) As diretrizes estabelecidas por esse conjunto de normas podem ser elencadas em cinco princípios gerais que orientam os gestores das três esferas da Federação.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**09**– Sobre a Política Nacional de Atenção Hospitalar no âmbito do SUS, assinale o que for correto.

- 01) Acolhimento caracteriza-se pela escuta ética e adequada das necessidades de saúde do usuário no momento de procura ao serviço de saúde e na prestação de cuidados com a finalidade de atender à demanda com resolutividade e responsabilidade.
- 02) Auditoria clínica caracteriza-se pelo protocolo pré-estabelecido, com a finalidade de dar agilidade ao atendimento a partir da análise do grau de necessidade do usuário, proporcionando atenção centrada no nível de complexidade e não na ordem de chegada.
- 04) Apoio matricial é o suporte técnico especializado, que é ofertado a uma equipe interdisciplinar de saúde, a fim de ampliar seu campo de atuação e qualificar suas ações, invertendo a lógica da fragmentação dos saberes.
- 08) Clínica ampliada é a administração de uma unidade ou órgão de saúde, como ambulatório, hospital, instituto e fundação, que se caracteriza como prestador de serviços do SUS.

**10**– O modelo federativo da Constituição Federal de 1988, sobre a descentralização das políticas públicas e dos recursos fiscais, se compõe de quatro formas de distribuir as competências na organização das responsabilidades entre a União, os Estados e os Municípios. Sobre o assunto, assinale o que for correto.

- 01) Competências exclusivas são áreas cujo campo de atuação pertence ao domínio de somente uma das esferas da federação, não podendo ser delegadas a outras.
- 02) Competências residuais são áreas cujo campo de atuação é compartilhado por, pelo menos, duas das três esferas da federação.
- 04) Competências concorrenciais (conjuntas ou comuns) são caracterizadas por áreas cujo campo de atuação não seja de domínio exclusivo (ou privativo) nem compartilhado.
- 08) Competências privativas são caracterizadas por áreas cujo campo de atuação pertence ao domínio de somente uma das esferas da federação, podendo ser delegadas a outras.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

## QUESTÕES ESPECÍFICAS

**11**– A Odontologia Hospitalar é a área de atuação do cirurgião-dentista em ambiente hospitalar. Sobre essa temática, assinale o que for correto.

- 01) O cirurgião-dentista que atua no ambiente hospitalar executa procedimentos odontológicos de baixa, média e/ou alta complexidade em pacientes internados.
- 02) O cirurgião-dentista atuante no ambiente hospitalar deve estar ciente e apto a desempenhar atividades de modo multidisciplinar e interdisciplinar.
- 04) A Odontologia Hospitalar procura participar do processo terapêutico e/ou contribuir na melhora da qualidade de vida dos pacientes, independente da doença apresentada pelos mesmos.
- 08) A atuação do cirurgião-dentista em ambiente hospitalar não é obrigatoriamente relacionada apenas a procedimentos cirúrgicos, principalmente a pacientes sob anestesia geral.

**12**– Na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), há uso de diversos equipamentos médicos, uma vez que o paciente deve ser monitorizado constantemente. Além disso, o paciente deve receber medicações, dietas e líquidos em velocidade lenta e constante e, em alguns casos, há necessidade de suporte ventilatório. Portanto, o cirurgião-dentista que atua em UTI deve conhecer esses equipamentos. Sobre esse tópico, assinale o que for correto.

- 01) O monitor multiparâmetro é um equipamento que faz a leitura dos sinais vitais do paciente, indicando em tempo real para a equipe médica: a pressão arterial, a frequência cardíaca, o traçado do eletrocardiograma, a saturação de Oxigênio (O<sub>2</sub>) e a temperatura corporal.
- 02) As bombas de infusão são equipamentos hospitalares com função de administrar soluções para o organismo por meio de sondas ou cateteres.
- 04) O padrão de referência para a saturação de oxigênio varia entre 50% e 70% em um indivíduo jovem e saudável, sendo um limite de até 40% aceitável.
- 08) A ventilação mecânica é um procedimento invasivo no qual se utiliza o tubo orotraqueal (TOT). Após melhora do quadro clínico do paciente, pode-se remover o TOT e parar com a ventilação mecânica, não havendo necessidade de “desmame”.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**13-** A Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAVM) é considerada uma pneumonia hospitalar e ocorre a partir de 48 horas da admissão do paciente na unidade de tratamento, sendo um dos tipos de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS) em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Sobre esse tema, assinale o que for correto.

- 01) A PAVM desenvolve-se após a aspiração de patógenos que colonizam as superfícies mucosas das vias orofaríngeas.
- 02) Manter o paciente em decúbito elevado entre 30° a 45° reduz as chances de aspirações do conteúdo orofaríngeo, nasofaríngeo ou gástrico e, por esse motivo, diminui a ocorrência de PAVM.
- 04) A higiene bucal com antisséptico à base de óleos essenciais, em solução alcoólica, está associada à importante redução na incidência de PAVM. Já o uso de solução de clorexidina 0,12% ou 0,2% não alcoólica apresentou pouco efeito sobre a microbiota bucal e não contribuiu para a diminuição da PAVM.
- 08) O constante acúmulo de secreções na orofaringe e o fato dos pacientes serem incapazes de eliminá-los, devido à perda do reflexo de tosse e sistema mucociliar deficiente, justifica a preocupação com a higiene bucal adequada e o controle da microbiota bucal nesses pacientes.

**14-** As Precauções Padrão (PP) são medidas que devem ser tomadas por todo trabalhador da área da saúde, com o objetivo de diminuir a transmissibilidade de agentes infecciosos que estão em fluidos corporais, em lesões de pele e mucosas e em material oriundo desse paciente ou que tenha entrado em contato com ele. Sobre essa temática, assinale o que for correto.

- 01) O uso de luvas de procedimentos estéreis dispensam a lavagem das mãos antes e depois de qualquer tipo de contato com o paciente.
- 02) O uso da máscara N95 ou PFF2 (Peça Facial Filtrante tipo 2) é indicado em todos os serviços de saúde durante a assistência ao paciente suspeito ou confirmado de COVID-19, principalmente em procedimentos geradores de aerossóis.
- 04) Conforme a Resolução ANVISA, RDC nº 306, de 7 de dezembro de 2004, os resíduos do Grupo E são constituídos por materiais perfurocortantes, como objetos e instrumentos contendo cantos, bordas, pontas ou protuberâncias rígidas e agudas capazes de cortar ou perfurar.
- 08) A imunização é importante no controle de doenças infecto-contagiosas, no entanto, não pode ser considerada como medida de proteção, tanto para a saúde dos profissionais, quanto dos pacientes em consultórios odontológicos.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**15-** A desinfecção do ambiente odontológico sempre foi muito importante na rotina clínica e agora com a pandemia de COVID-19 foi intensificada. Sobre esse processo, assinale o que for correto.

- 01) A desinfecção proporcionada pelo Álcool Etílico a 70% é de nível médio e a sua aplicação se faz por fricção em 3 etapas, intercaladas pelo tempo de secagem natural. Essa solução pode ser aplicada na desinfecção de artigos metálicos, superfícies e tubetes anestésicos.
- 02) O Ácido Peracético 0,2 ou 0,5% proporciona uma desinfecção de alto nível e possui a vantagem de não formar resíduos tóxicos e ser efetivo na presença de matéria orgânica.
- 04) A solução de Hipoclorito de Sódio 1% apresenta ação microbicida e é indicada para desinfecção de superfícies, artigos não metálicos e materiais termossensíveis. Porém, essa substância é inativada por matéria orgânica e pode causar irritação em pele.
- 08) Embora o Álcool Etílico a 70% seja de fácil aplicação, ele é volátil, permanece ativo quando aplicado em superfície contaminada por matéria orgânica e não resseca materiais plásticos.

**16-** Considerando a composição do biofilme dentário, assinale o que for correto.

- 01) É estimado que somente cerca de 50% da microbiota bucal residente possa ser cultivado em laboratório.
- 02) O sulco gengival tem uma microbiota diversa, incluindo principalmente espécies Gram-positivas e sacarolíticas.
- 04) Com base na clonagem do gene 16S rRNA, identificou-se cerca de 900 espécies na cavidade bucal.
- 08) Um dos principais benefícios da existência de uma microbiota residente na cavidade bucal é a capacidade de prevenir a colonização por microrganismos exógenos.

**17-** Em relação à película adquirida, assinale o que for correto.

- 01) É uma biopelícula formada pós-eruptivamente pela adsorção de proteínas e glicoproteínas salivares e do fluido gengival na superfície dentária.
- 02) É formada por cinco proteínas específicas, sendo: glicoproteínas, albumina, lisozima, gelatinase e metaloproteinase.
- 04) Pode ter ação de proteção da superfície do esmalte, influência na aderência de microrganismos bucais, substrato para microrganismos adsorvidos e reservatório de íons.
- 08) Quando um dente é totalmente limpo e polido, expondo a superfície do esmalte e contendo hidroxapatita ao ambiente bucal, ele será recoberto pela película adquirida após 24 horas.

**18-** Considerando a escovação dental, assinale o que for correto.

- 01) A técnica vibratória (técnica de Stillman) foi elaborada para o massagem e a estimulação das gengivas, assim como para a limpeza das áreas cervicais dos dentes.
- 02) A escovação dental por 1 minuto, tanto com escovas manuais quanto elétricas, é suficiente para a remoção de placas.
- 04) Se a placa se acumular livremente na região dentogengival, sinais subclínicos de inflamação gengival aparecem dentro de 24 horas.
- 08) A técnica vibratória (técnica de Charters) foi elaborada para aumentar a efetividade da limpeza e a estimulação gengival das áreas interproximais.

**19-** Em relação ao uso de compostos de amônia quaternária no controle químico do biofilme dental, assinale o que for correto.

- 01) A substantividade aproxima-se de 8 a 12 horas.
- 02) O mecanismo de ação depende da parte hidrofílica da molécula em interagir com a membrana celular bacteriana, levando à perda dos componentes celulares, interferência no metabolismo celular e inibição do crescimento celular.
- 04) Os efeitos adversos incluem coloração dental e da língua, irritação gengival transitória e úlceras aftosas.
- 08) São agentes monocatiônicos rapidamente absorvidos pelas superfícies bucais.

**20-** Em relação ao uso de bisbiguanidas no controle químico do biofilme dental, assinale o que for correto.

- 01) Interação com as glicoproteínas salivares, levando à reduzida formação da película salivar.
- 02) Unem-se reversivelmente aos tecidos bucais, com uma lenta liberação que permite efeitos antimicrobianos constantes (até 12 horas).
- 04) Possuem uma molécula com um anel clorofenólico e um grupo biguanida, conectados por uma ponte central de hexametileno.
- 08) São ativas contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, fungos e vírus.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**21-** Quanto à anestesiologia aplicada à Odontologia, analise a seguinte situação: um novo anestésico local foi criado com dose máxima por sessão ou consulta recomendada de 7,5 miligramas por quilograma (mg/kg) limitada a 600 mg de dose máxima. A concentração ideal para a anestesia foi de 5% (apresentação comercial). A esse anestésico foi adicionado como vasoconstritor a adrenalina 1:100.000, com dose máxima recomendada para pacientes saudáveis de 0,2 mg por consulta. Para os cálculos e doses, considere um tubete anestésico contendo 2 ml (mililitros) de solução. Diante disso, assinale o que for correto.

- 01) A quantidade máxima de anestésico (considerando apenas o anestésico) para um paciente saudável de 80 quilogramas é de 5 tubetes (de 2 ml).
- 02) A dose máxima do anestésico/vasoconstritor para um paciente saudável de 50 quilogramas é de aproximadamente 3,8 tubetes (de 2 ml).
- 04) A dose máxima do anestésico/vasoconstritor para um paciente saudável de 20 quilogramas é de aproximadamente 1,5 tubetes (de 2 ml).
- 08) A dose máxima do anestésico/vasoconstritor é de 10 tubetes (de 2 ml) para um paciente saudável de 100 quilogramas.

**22-** Quanto ao processo de diagnóstico e tratamento das deformidades dentofaciais, assinale o que for correto.

- 01) Um "corredor bucal" excessivamente escuro ao sorriso pode ser devido a uma deficiência maxilar transversa ou a uma deficiência maxilar sagital ou devido aos dentes posteriores da maxila inclinados palatalmente.
- 02) A maneira de se avaliar a linha média dental mandibular é considerando a relação com o ponto médio do mento, a linha média dental maxilar e a linha média facial.
- 04) Quanto à avaliação do parâmetro sagital em vista frontal da face, a percepção da exposição aumentada da esclera acima da pálpebra inferior e abaixo da íris é um sinal de deficiência do meio da face (porção média da face).
- 08) Quanto às proporções transversas da face, vários fatores devem ser observados, tais como a "regra dos quintos" onde cada quinto tem aproximadamente a largura de um olho, ou ainda, a largura da boca que é aproximadamente igual à distância entre as margens mediais da íris, ou a largura da base alar que é aproximadamente igual à distância intercantal, entre outras.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**23-** Conhecer a localização e disseminação das infecções odontogênicas é de importância para o tratamento. Quanto às infecções odontogênicas, assinale o que for correto.

- 01) A disseminação da infecção da fossa canina geralmente se origina dos dentes caninos superiores ou pré-molares superiores e frequentemente se apresenta acima da inserção do músculo bucinador produzindo uma atenuação ou apagando o sulco nasolabial.
- 02) A infecção no espaço vestibular, na região dos molares inferiores e superiores, se expande pelo espaço intrabucal, superficialmente ao músculo bucinador à frente da margem anterior do músculo masseter. A sua manifestação clínica é caracterizada por tumefação restrita à bochecha, contudo, pode estender-se superiormente, em direção ao espaço temporal, inferiormente ao espaço submandibular ou posteriormente, em direção ao espaço massetérico.
- 04) O espaço submassetérico é delimitado medialmente pelo músculo pterigóideo medial e lateralmente pela superfície medial da mandíbula, anteriormente pela rafe pterigomandibular e posteriormente pelo lobo profundo da glândula parótida. O músculo pterigóideo lateral forma o teto desse espaço.
- 08) O espaço submandibular localiza-se acima do músculo milohióideo, lateralmente ao ramo e ao corpo da mandíbula. É delimitado posteriormente pelas inserções do ventre anterior do músculo digástrico e anteriormente pelo ventre posterior desse músculo e pelo ligamento estilomandibular.




---

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**24-** A respeito da biossegurança aplicada à Odontologia e com relação à COVID-19, assinale o que for correto.


- 01) Quanto à triagem prévia de pacientes odontológicos, o paciente apresentou recentemente (dois dias atrás) temperatura maior que 37,8 °C (graus Celsius) e respondeu positivamente a questão relacionada a perda de paladar e olfato. Nesse caso, deve-se adiar o atendimento clínico eletivo por dois dias (48 horas).
- 02) A eficiência mínima de filtragem de ar é determinada em função da classe de risco e/ou dos procedimentos desenvolvidos no ambiente e, para ambientes com usuários com infecção transmitida pelo ar, indica-se a utilização de filtros grossos com eficiência gravimétrica para pó sintético, cuja eficiência tenha sido certificada pelo fabricante.
- 04) O uso de uma unidade portátil de filtragem de ar HEPA (*High Efficiency Particulate Air Filters*) deve ser considerado durante e imediatamente após um procedimento de geração de aerossol. O uso dessas unidades reduz a contagem de partículas (incluindo gotículas) no ambiente e diminui o tempo de rotatividade.
- 08) A paramentação e a desparamentação devem ocorrer em ambientes distintos, amplos, com todas as condições ideais de armazenamento e descarte dos EPI (Equipamentos de Proteção Individual), todavia, na impossibilidade de criação de espaço externo à clínica, as pessoas envolvidas na assistência odontológica deverão se desparamentar no ambiente clínico, ficando somente com os EPI que protegem as vias aéreas e oculares, que serão retirados no ambiente externo.



---

**25-** Quanto ao diagnóstico e tratamento do trauma buco-maxilofacial na avaliação inicial do paciente, assinale o que for correto.

- 01) A anisocoria é o termo dado à apresentação clínica irregular da forma ou formato da pupila e, se presente, deve-se levantar forte suspeita de lesão do globo ocular. Se a pupila apresentar formato de lágrima, o ponto da lágrima geralmente aponta à área da ruptura do globo, principalmente se houver lacerações na pálpebra.
- 02) Logoftalmo é a incapacidade de fechar completamente as pálpebras. Essa condição é mais provavelmente causada por danos no VII nervo craniano (nervo facial).
- 04) A Pupila de Marcus Gunn indica que houve lesão no III nervo craniano (nervo oculomotor).
- 08) Hemorragia subconjuntival é o acúmulo de sangue sob a conjuntiva e geralmente cessa sem que haja intervenção.



---

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**26-** Quanto ao acesso ao esqueleto da face, no acesso retromandibular, assinale o que for correto.

- 01) O acesso retromandibular expõe grande área do ramo mandibular e, portanto, é útil para o tratamento das fraturas condilares. A incisão do acesso retromandibular começa aproximadamente 5 milímetros abaixo do lóbulo da orelha e se estende inferiormente por cerca de 3 a 3,5 centímetros.
- 02) Após a incisão da pele e tecido subcutâneo, a primeira estrutura anatômica a ser identificada é a glândula parótida.
- 04) Geralmente, infiltrações com anestésicos locais contendo vasoconstritores são utilizadas nos acessos cirúrgicos a fim de promover melhor controle hemostático a ferida, todavia, nesse acesso em especial deve-se evitar a infiltração em profundidade dessas substâncias por impedirem a identificação por estimulação eletromotora do nervo facial, dificultando assim sua identificação no transcirúrgico.
- 08) A glândula parótida deve ser atravessada por dissecação romba em uma direção anteromedial, buscando-se o bordo posterior da mandíbula. Em muitas ocasiões o ramo cervical do nervo facial é encontrado nesse caminho, porém esse ramo pode ser cortado sem maior significância clínica, permitindo assim maior área de exposição óssea.

**27-** Quanto a infecções que acometem a região bucomaxilofacial, assinale o que for correto.

- 01) A sífilis primária é caracterizada pelo cancro, que se desenvolve na área de inoculação, tornando-se clinicamente evidentes entre 3 a 90 dias após a exposição inicial. Embora lesões múltiplas do cancro possam ser observadas, a maioria é solitária. As lesões bucais são mais observadas nos lábios, mas outras áreas incluem a língua, palato, gengiva e amígdalas.
- 02) Ao contrário do cancro isolado encontrado na sífilis primária, lesões múltiplas são típicas da sífilis secundária. Essas lesões secundárias são conhecidas como goma sífilítica.
- 04) O diagnóstico da sífilis pode ser confirmado pela demonstração dos micro-organismos espiralados no exame de campo escuro de um esfregaço do exsudato de uma lesão ativa, todavia resultados falso-positivos são possíveis com essa técnica.
- 08) Testes sorológicos específicos e altamente sensíveis para a sífilis incluem a absorção de anticorpos treponêmicos fluorescentes (FTAABS), ensaios de hemaglutinação do *T. pallidum* (TPHA), ensaios de aglutinação de partículas do *T. pallidum* (TPPA) e ensaios de micro-hemaglutinação para anticorpos contra *T. pallidum* (MHA-TP).

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**28-** Quanto à avaliação inicial de pacientes a serem submetidos a procedimentos cirúrgicos, assinale o que for correto.

- 01) Pacientes com história de radioterapia envolvendo os ossos maxilares podem possuir um dano permanente no tecido ósseo, com risco acentuado de osteorradionecrose após a extração dentária ou trauma.
- 02) Um paciente que relata uma incapacidade de subir um lance de escadas sem relatar falta de ar, fadiga ou dor no peito pode apresentar risco aumentado de complicações médicas durante o tratamento dentário.
- 04) Mudanças na pele e unhas com frequência estão associadas a doenças sistêmicas. Por exemplo, cianose pode indicar insuficiência cardíaca ou pulmonar, icterícia indicar doença hepática, e petéquias ou equimoses podem ser um sinal de discrasia sanguínea ou distúrbio hemorrágico.
- 08) O relato do uso crônico de corticosteroides é de relevância porque seu uso pode resultar em insuficiência adrenal e, por esse motivo, tornar o paciente incapaz de coagular adequadamente o sangue.

**29-** Em relação à tomografia computadorizada, assinale o que for correto.

- 01) Como parâmetro do processo de aquisição, a sigla "FOV - Campo de visão", representa o tamanho do campo visual a ser avaliado.
- 02) Uma das importantes limitações das imagens obtidas pela técnica da tomografia computadorizada por feixe cônico (TC *cone beam*) é a impossibilidade da visualização adequada dos tecidos moles.
- 04) Uma das vantagens da técnica da tomografia computadorizada por feixe cônico (TC *cone beam*) em relação a técnica de tomografia computadorizada helicoidal (TC *fan beam*) é a não formação de artefatos metálicos na imagem.
- 08) Na técnica da tomografia computadorizada por feixe cônico (TC *cone beam*), o feixe de raios X é em forma de cone em largura.

**30-** Em relação à anatomia imaginológica, assinale o que for correto.

- 01) O "recesso frontal" representa o caminho para a drenagem do seio frontal para o meato médio. Em tomografia, essa estrutura é melhor visualizada nos planos sagital e coronal.
- 02) O "forame mental" representa o limite anterior do canal mandibular, não sendo possível ser observado nos exames de imagens empregados em Odontologia.
- 04) A "Fóvea submandibular" representa uma concavidade óssea, na qual situa-se a glândula submandibular.
- 08) O seio frontal não é observado em radiografias periapicais.