

QUESTÕES REFERENTES A POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE E MODELOS DE ATENÇÃO À SAÚDE

01- Em relação à Atenção Primária à Saúde, assinale o que for correto.

- 01) Sua prática clínica exige diversas especialidades e uso de recursos tecnológicos e terapêuticos.
- 02) É composta por um conjunto de ações de saúde que, no contexto do SUS, utiliza tecnologias de cuidado de baixa complexidade.
- 04) Se constitui como o primeiro contato de atenção à saúde e deve manter-se isolada física e organizacionalmente dos demais níveis.
- 08) É o nível de atenção à saúde responsável pela gestão e coordenação do cuidado.

02- A territorialização, como base do trabalho da Equipe de Saúde da Família, determina a prática da Vigilância em Saúde. Sobre esse tema, assinale o que for correto.

- 01) A análise do território impede o enfrentamento dos problemas de saúde dada a diversidade cultural.
- 02) A territorialização implica no reconhecimento e mapeamento do território.
- 04) A territorialização contribui para o planejamento em saúde.
- 08) O território em saúde é um espaço geográfico onde as pessoas vivem e trabalham.

03- Identifique os princípios da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e da prática dos trabalhadores na Estratégia Saúde da Família e assinale o que for correto.

- 01) Integralidade, continuidade do cuidado, participação social.
- 02) Acessibilidade, humanização, equidade.
- 04) Universalidade, vínculo, integralidade.
- 08) Transversalidade, unicidade e atendimento de urgência.

04- Assinale o que for correto. Os indicadores de saúde podem constituir o insumo para o estabelecimento de políticas públicas melhor ajustadas às necessidades da população e, nesse sentido, representam:

- 01) O instrumento utilizado para a gestão da situação de saúde.
- 02) O instrumento que estratifica o risco epidemiológico e identifica áreas críticas.
- 04) A evidência sobre a situação sanitária apenas no município.
- 08) O instrumento que facilita o monitoramento de objetivos e metas em saúde.

05- A respeito dos Conselhos de Saúde, assinale o que for correto.

- 01) Os Conselhos de Saúde foram criados para que a população possa exercer o controle social sobre a gestão da saúde.
- 02) Os Conselhos de Saúde são formados exclusivamente por representantes dos usuários do Sistema Único de Saúde a fim de avaliar a assistência à saúde fornecida à população.
- 04) O controle social é a participação da sociedade no acompanhamento e verificação de ações da gestão pública na execução das políticas públicas, avaliando os objetivos, processos e resultados.
- 08) A Lei nº 8.142/1990 instituiu a formação dos Conselhos de Saúde.

06- Considerando as características da Vigilância Epidemiológica, descritas na Lei nº 8.080/1990, assinale o que for correto.

- 01) A adoção de medidas de prevenção e controle de doenças é parte integrante da Vigilância Epidemiológica.
- 02) A Vigilância Epidemiológica representa o conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção e/ou prevenção de fatores da saúde.
- 04) Vigilância Epidemiológica atua sobre mudanças nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva.
- 08) Vigilância Epidemiológica está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).

07- Com relação ao atendimento domiciliar e à internação domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale o que for correto.

- 01) O atendimento e a internação domiciliares são realizados por indicação médica, com concordância do paciente e de sua família.
- 02) No âmbito do SUS, há previsão para o atendimento domiciliar e a internação domiciliar.
- 04) A internação domiciliar visa exclusivamente a atuação da medicina preventiva e será realizada por equipe multidisciplinar.
- 08) Na modalidade do atendimento e internação domiciliares, somente os procedimentos de enfermagem e de fisioterapia podem ser incluídos.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

08- Considerando as práticas de financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale o que for correto.

- 01) O Governo Federal é o único responsável pelo financiamento do SUS em todas as instâncias de saúde.
- 02) Na esfera federal, o Ministério da Saúde executa o financiamento do SUS por meio do Fundo Nacional de Saúde.
- 04) O modelo adotado pelo SUS é descentralizado e de gestão compartilhada entre União, Estados e Municípios.
- 08) O uso dos recursos municipais no SUS é fiscalizado pelas equipes de saúde locais.

09- Em relação aos determinantes sociais de saúde, assinale o que for correto.

- 01) Sabe-se que as condições de vida e trabalho dos indivíduos e grupos da população estão relacionadas com sua situação de saúde.
- 02) Iniquidades em saúde estão vinculadas com as condições sociais da população.
- 04) Ações políticas coordenadas e intersetoriais influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população.
- 08) Indivíduos com baixa escolaridade e acesso restrito a informações têm oportunidades reduzidas de vida com qualidade.

10- Com relação às diretrizes organizativas e aos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale o que for correto.

- 01) A Equidade pressupõe a oferta de ações e serviços de saúde de maneira diferenciada entre segmentos populacionais.
- 02) A Hierarquização privilegia o modelo da pirâmide como forma de constituição dos fluxos assistenciais.
- 04) A Participação Comunitária impede que segmentos sociais auxiliem na definição e na execução de políticas de saúde.
- 08) O princípio da Integralidade orientou a expansão das ações de saúde, incluindo as ações de caráter intersetorial e multiprofissional.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

QUESTÕES ESPECÍFICAS

11- O equilíbrio hidroeletrólítico é um processo dinâmico crucial à vida, e seus distúrbios podem ocorrer em qualquer contexto, em qualquer doença e em várias condições que afetam indivíduos saudáveis e doentes. Neste contexto, assinale o que for correto.

- 01) O déficit de volume de líquido (hipovolemia) pode manifestar-se em diferentes gravidades, dependendo do grau de perda de líquido, podendo apresentar sinais como diminuição de turgor da pele, oligúria, hipotensão postural, taquicardia, pele fria e úmida, redução de volume de língua, veias cervicais colapsadas, entre outros sinais clínicos.
- 02) A hipercalemia ou hiperpotassemia manifesta-se principalmente em alterações cardíacas, sendo crucial que o enfermeiro realize a monitorização precoce e avaliação de arritmias, ficar atento aos sinais de fraqueza muscular, sintomas gastrointestinais e avaliação criteriosa do paciente buscando possíveis causas da elevação do potássio.
- 04) A hipocalcemia pode estar associada à ingestão baixa de cálcio, perdas aumentadas ou má absorção do sal. Níveis críticos de hipocalcemia podem manifestar sinais e sintomas associados à hiperatividade neuromuscular, como tetania e confusão, delírium ou até mesmo convulsões.
- 08) A avaliação dos distúrbios acidobásicos sinaliza a causa subjacente do problema e guia o tratamento apropriado, conforme a causa do desequilíbrio. Na acidose metabólica, observa-se valores de pH sanguíneo abaixo de 7,35 e bicarbonato abaixo de 22 mEq/l (valor de referência de 22 a 26 mEq/l em sangue arterial) e a hiperpotassemia pode acompanhar a acidose em consequência da transferência de potássio para fora das células.

12- As doenças do sistema nervoso podem ocorrer em qualquer faixa etária e causar sintomas autolimitantes brandos, ou distúrbios devastadores e potencialmente fatais. Sob essa ótica, assinale o que for correto.

- 01) Na avaliação neurológica, habitualmente, utiliza-se a Escala de Coma de Glasgow, criada em 1974 e atualizada recentemente em 2018, sendo incluída a avaliação de reatividade pupilar à luz, esta última com escore de avaliação de 0 a 15 pontos.
- 02) São exemplos de lesões traumáticas encefálicas a concussão, contusão, lesão axional difusa e o acidente vascular encefálico.
- 04) Na avaliação clínica realizada pelo enfermeiro, busca-se queixas e sintomas que guiam diagnósticos e intervenções de enfermagem no contexto neurológico, a exemplo de dor, cefaleia e enxaqueca, convulsões, tontura e vertigem, distúrbios visuais, fraqueza, sensibilidade anormal, entre outros.
- 08) Um dos cuidados ao doente neurocrítico é a monitorização da pressão intracraniana e a manutenção da pressão de perfusão cerebral adequada, sendo esta calculada pela diferença entre a pressão arterial média e a pressão intracraniana.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

13- Problemas respiratórios são uma grande causa de Parada Cardiorrespiratória em crianças, sendo observado progressão de distúrbios respiratórios preveníveis com medidas através de identificação precoce e tratamento eficaz, evitando a progressão muitas vezes fatal em situações de insuficiência respiratória. Sobre esse assunto, assinale o que for correto.

- 01) No tratamento inicial de desconforto respiratório na criança que não esteja em PCR, preconiza-se a avaliação rápida e específica da função respiratória para identificar o tipo e gravidade, e não a etiologia precisa do problema respiratório.
- 02) Em se tratando de obstrução de via aérea superior em crianças, em situações onde a criança é capaz de emitir sons e tossir, não intervenha.
- 04) Em atendimento a crianças com crise de asma, recomenda-se administrar somente bronco dilatador (ex: salbutamol) até resolução da crise.
- 08) O enfermeiro pode, além de medidas específicas de atendimento à criança com distúrbio respiratório, realizar medidas adicionais de atendimento, como monitorar saturação de oxigênio, frequência e ritmo cardíaco e estabelecer um acesso vascular (quando possível).

14- Conforme as orientações de atendimento e reanimação do recém-nascido ≥ 34 semanas em sala de parto das Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria atualizadas em 2022, assinale o que for correto.

- 01) Todo material necessário para a reanimação deve ser preparado, testado e estar disponível em local de fácil acesso, antes do nascimento. Esse material é destinado à avaliação do paciente, manutenção da temperatura, aspiração de vias aéreas, ventilação e administração de medicações.
- 02) Recomenda-se, no RN ≥ 34 semanas com respiração adequada e tônus muscular em flexão ao nascimento, clampear o cordão umbilical 1-3 minutos depois da sua extração completa da cavidade uterina, posicionando no abdome ou tórax materno, evitando a perda da temperatura corporal enquanto aguarda-se o clameamento.
- 04) A temperatura corporal do RN à admissão na unidade neonatal é um forte preditor de morbidade e mortalidade em todas as idades gestacionais, sendo considerada um indicador da qualidade do atendimento. Recomenda-se que a temperatura axilar do RN seja mantida entre $36,5^{\circ}\text{C}$ - $37,5^{\circ}\text{C}$, desde o nascimento até a admissão no alojamento conjunto ou na unidade neonatal.
- 08) A Frequência Cardíaca (FC) é o principal determinante da decisão de indicar as diversas manobras de reanimação, considerando-se valores normais acima de 80 batimentos por minuto ($\text{FC} > 80\text{bpm}$).

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

15- O choque é uma condição comum em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), afetando cerca de um terço dos pacientes. O suporte hemodinâmico precoce e adequado é essencial para evitar piora e perpetuação das disfunções orgânicas. Intervenções terapêuticas de suporte, como garantir oxigenação adequada, uso de fluidos e drogas vasoativas devem ser iniciadas mesmo quando a investigação da causa está em andamento. Em relação a esse assunto, assinale o que for correto.

- 01) A oferta de oxigênio aos pacientes deve ser realizada em todas as situações em que houver hipotensão ou taquiarritmia, buscando manter uma oximetria de pulso o mais próximo de 100%.
- 02) A norepinefrina, comumente utilizada em estado hipotensivo na UTI, é uma droga simpaticomimética, ou seja, ela irá mimetizar as ações produzidas pela estimulação dos nervos simpáticos adrenérgicos, causando aumento da pressão sistólica e diastólica.
- 04) A monitorização de PA Invasiva em pacientes com instabilidade hemodinâmica por meio de punção arterial é um procedimento que pode ser realizado pelo profissional enfermeiro, conforme resoluções do Conselho.
- 08) Na ausculta cardíaca, está uma prática essencial para avaliação cardiovascular dos pacientes críticos, a presença de 3ª bulha cardíaca pode sinalizar hipervolemia.

16- A nutrição enteral refere-se à terapia nutricional ao paciente através do trato gastrointestinal, seja por inserção de cateteres/sondas ou por estomas de alimentação (gastrostomia ou jejunostomias). Em relação a esse assunto, assinale o que for correto.

- 01) A administração de nutrição por cateteres deve ser precedida de testes que confirmem o posicionamento dos mesmos, sendo realizado pelo teste de ausculta de posicionamento em região epigástrica.
- 02) A gastrostomia é indicada como via de acesso temporário e de curto prazo para pacientes com problemas de deglutição, doenças graves na orofaringe e com funcionalidade do trato gastrointestinal preservada.
- 04) A infusão de dieta deve ser interrompida durante procedimentos como aspiração traqueal, cuidados de higiene corporal, transporte e outros que possam interferir na administração da dieta.
- 08) Os pacientes portadores de sondas para alimentação não necessitam ter higiene oral diariamente devido ausência de trajeto de alimentos pela via oral.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

17- A Segurança do Paciente é um atributo que fortalece a qualidade do cuidado, e tem adquirido, em todo o mundo, grande importância para os pacientes, famílias, gestores e profissionais de saúde com a finalidade de oferecer uma assistência segura, pautados nas ações do Programa Nacional de Segurança do Paciente, este articulado com os objetivos da Aliança Mundial. Em relação a esse assunto, assinale a(s) alternativa(s) correta(s) que se relacione(m) com as metas de segurança do paciente.

- 01) Identificar o paciente corretamente.
- 02) Reduzir o risco de danos ao paciente, decorrente de quedas e lesões por pressão.
- 04) Assegurar cirurgias com local de intervenção correto, procedimento correto e paciente correto.
- 08) Reduzir o risco de infecções associadas a cuidados de saúde higienizando as mãos.

18- As Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) são um dos eventos adversos mais frequentes associados à assistência à saúde e um grave problema de saúde pública, pois aumentam a morbidade, a mortalidade e os custos a elas relacionados. Sendo assim, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, atendendo ao preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), vem desenvolvendo diversas ações estratégicas no âmbito nacional com vistas à redução do risco de aquisição das IRAS, publicando desde 2013 versões do Programa Nacional de Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (PNPCIRAS). Em relação ao PNPCIRAS vigente (2021-2025), assinale a(s) alternativa(s) correta(s) que se relacione(m) às metas preconizadas pela ANVISA.

- 01) Até 2025, 90% dos hospitais com leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) respondendo a Avaliação Nacional dos Programas de Prevenção e Controle de Infecção (ANPCI).
- 02) Até 2025, reduzir a incidência de *Acinetobacter spp.* sensível aos carbapenêmicos, em isolados de Infecção Primária de Corrente Sanguínea Laboratorial (IPCSL- cateter central).
- 04) Até 2025, reduzir os valores do percentil 90 (P90) da densidade de incidência agregada em âmbito nacional de Infecção de Trato Urinário (ITU) associada à cateter vesical de demora (CVD).
- 08) Até 2025, 60% dos hospitais com UTI adulto, que responderam ao formulário da avaliação nacional das práticas de segurança do paciente, com Protocolo de Prevenção de PAV implementado.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

19- O desafio para prevenir danos aos usuários dos serviços de saúde e prejuízos associados aos cuidados decorrentes de processos ou das estruturas da assistência é cada vez maior e, portanto, é necessário a atualização de protocolos específicos de critérios diagnósticos e medidas de prevenção para a redução das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde – IRAS. Buscando a prevenção como melhor prática assistencial, assinale a(s) alternativa(s) correta(s) que se relacione(m) às medidas de prevenção de IRAS preconizadas pela ANVISA.

- 01) A retirada precoce de pacientes internados nestas unidades pode exercer efeitos maléficos sobre a recuperação da atividade funcional e prevenção de Pneumonia Associado a Ventilação Mecânica (PAV), com consequente aumento no tempo de permanência e custos, devido risco de perda de dispositivos.
- 02) Para prevenção de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC), não deve ser feita a tricotomia de rotina, e se os pelos tiverem que ser removidos, deve-se fazê-lo imediatamente antes da cirurgia, utilizando tricotomizadores elétricos, e fora da sala de cirurgia.
- 04) A implantação de visita diária com médico e enfermeiro revisando a necessidade da manutenção do cateter vesical de demora pode prevenir Infecção do Trato Urinário associado ao cateter (ITU-AC).
- 08) Para a estabilização do cateter vascular pode ser utilizado fitas adesivas não estéreis (esparadrapo comum e fitas do tipo microporosa não estéreis, como micropore) coberturas de cateteres, como medida de prevenção de infecções da corrente sanguínea relacionada a cateteres centrais (ICSRC).

20- A Norma Regulamentadora – NR 32 que regulamenta a Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, publicada em 11 de novembro de 2005 e atualizada em 13 de abril de 2022, tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) que se relacione(m) às orientações presentes nesta NR-32.

- 01) Em relação aos riscos biológicos, considera-se a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos, sejam eles os microrganismos, geneticamente modificados ou não; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons.
- 02) Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual.
- 04) Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas devem conter lavatório em seu interior.
- 08) Os trabalhadores devem comunicar em até 48 horas todo acidente ou incidente, com possível exposição a agentes biológicos, ao responsável pelo local de trabalho e, quando houver, ao serviço de segurança e saúde do trabalho e à comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA.

21- Quanto ao processo de envelhecimento, assinale a(s) alternativa(s) que não apresenta(m) características relativas à senescência.

- 01) Aumento da função renal; aumento do volume cerebral; redução da espessura da parede arterial.
- 02) Aumento do volume pulmonar; redução da rigidez arterial; aumento da função mucociliar.
- 04) Arco senil; xerostomia; redução da altura das vilosidades intestinais.
- 08) Pele seca; aumento da rigidez da caixa torácica; alteração ciclo sono-vigília.

22- Em relação às complicações crônicas do diabetes *mellitus* (DM), assinale o que for correto.

- 01) As neuropatias diabéticas constituem a complicação crônica menos prevalente, diagnosticada e tratada do DM.
- 02) A osteomielite está potencialmente relacionada à úlcera no pé diabético, especialmente aquelas existentes há muitas semanas ou extensas, profundas ou localizadas sobre uma proeminência óssea ou com exposição óssea.
- 04) Recomenda-se que o primeiro rastreamento de doença renal do diabetes e de retinopatia diabética deve ser realizado logo após o diagnóstico de DM.
- 08) A neuropatia periférica diabética é uma complicação precoce e polimórfica em que, pelo menos, metade dos indivíduos permanece assintomática por muitos anos.

23- A Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Quanto a ela, assinale o que for correto.

- 01) É permitida a internação de pacientes com transtornos mentais em instituições com características asilares.
- 02) É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde às pessoas com transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família.
- 04) Constitui-se como um dos direitos da pessoa com transtorno mental ser tratado em ambiente terapêutico pelos meios mais invasivos possíveis.
- 08) São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: internação voluntária, involuntária e compulsória.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

24- Quanto à emergência psiquiátrica (EP), assinale o que for correto.

- 01) Na EP, a aparência do paciente pode oferecer indicadores cruciais sobre a capacidade de cuidar de si mesmo e sobre o juízo crítico.
- 02) Na EP, com um paciente psicótico, o fundamental é a realização do exame físico do paciente.
- 04) Uma tentativa de suicídio que não resulta em morte é um importante fator de risco para novas tentativas com métodos mais letais.
- 08) A contenção mecânica costuma ser utilizada em pacientes que estejam em quadro de agitação psicomotora e deve ter como objetivo primordial sua proteção, a de outros pacientes e a da equipe médica.

25- Concernente à Resolução COFEN 358/2009 sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem, assinale o que for correto.

- 01) Quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros, o Processo de Saúde de Enfermagem corresponde à Consulta de Enfermagem.
- 02) O Processo de Enfermagem deve basear-se num suporte teórico que oriente desde a coleta de dados até a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados.
- 04) A execução do Processo de Enfermagem deve ser registrada formalmente, envolvendo, dentre outras coisas, os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença.
- 08) O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorra o cuidado profissional de Enfermagem.

26- O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes. A respeito delas, assinale o que for correto.

- 01) O enfermeiro deve coletar e registrar toda informação necessária para prevenir/detectar e controlar os problemas de saúde potenciais ou reais, visando à promoção da saúde, a independência e o bem estar da pessoa, família e coletividade.
- 02) Assim como com todas as ações de enfermagem, tanto nas intervenções independentes quanto nas dependentes, o enfermeiro necessita desenvolver competência técnica e conhecimentos para a sua execução.
- 04) No momento de selecionar a intervenção de enfermagem, o enfermeiro deve conhecer as possibilidades de planejá-la, seja por meio de protocolos, rotinas ou padrões de orientações.
- 08) Para elaboração dos diagnósticos de enfermagem, é importante que o enfermeiro determine, dentre outras coisas, se existem problemas de saúde potenciais ou reais que exigem intervenção e controle de enfermagem, bem como necessidades de aprendizado da pessoa, família e coletividade que devem ser abordadas.

27- A amamentação é importante à saúde do lactente sob o aspecto nutricional, imunológico, gastrointestinal, psicológico, do desenvolvimento e da interação entre mãe e filho. Quanto ao aleitamento materno, assinale o que for correto.

- 01) O pré-natal é um momento inicial de prestação de cuidados propícios para se trabalhar a questão da amamentação com os pais, considerando-a tema transversal e abrindo-se para a participação de uma equipe multiprofissional.
- 02) Cremes e pomadas devem ser usados na higiene da mama, além do uso de água e sabão após cada mamada.
- 04) A amamentação ajuda a reduzir o risco de hemorragia pós-parto e é considerada como plenamente efetiva como um método anticoncepcional sempre até o primeiro ano pós-parto.
- 08) O profissional de saúde deve estar habilitado para o bom manejo clínico da amamentação, compreendendo as bases principais a serem observadas, supervisionadas e orientadas: posicionamento, pega correta e sucção efetiva.

28- Relativo aos fenômenos clínicos e mecânicos do parto, assinale o que for correto.

- 01) Estimula-se a realização de procedimentos como manutenção do jejum, tricoxisma e tricotomia, mesmo em casos de parturiente de risco habitual.
- 02) A auscultação dos batimentos cardíacos do feto (BCF) intermitente deve ser realizada com a parturiente deitada em decúbito dorsal.
- 04) A fase de dilatação ou primeiro período do parto tem início com as contrações uterinas rítmicas, que começam por modificar ativamente a cérvix, e terminam quando a sua ampliação está completa, ou seja, com 10 cm.
- 08) A ruptura espontânea da bolsa das águas, ou amniorrexe, com evasão parcial do conteúdo líquido do ovo, dá-se, em 80% dos casos, no fim da dilatação ou no início da expulsão.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

29- Quanto à legislação que ampara o exercício profissional do Enfermeiro, assinale o que for correto.

- 01) O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe, privativamente, dentre outras funções, a organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços.
- 02) Como integrante da equipe de saúde, cabe ao Enfermeiro, dentre outras funções, a participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação e a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.
- 04) O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de Enfermagem.
- 08) O exercício da atividade de Enfermagem, com respeito aos diferentes graus de habilitação, é privativo exclusivamente do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem.

30- Quanto ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale o que for correto.

- 01) É direito dos profissionais de enfermagem participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão.
- 02) Constitui-se como dever a manutenção do sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto nos casos previstos na legislação ou por determinação judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante ou responsável legal.
- 04) Fatos sigilosos não deverão ser revelados mesmo em situações de ameaça à vida e à dignidade, na defesa própria ou em atividade multiprofissional, quando necessário à prestação da assistência.
- 08) Considera-se infração ética e disciplinar a ação, omissão ou conivência que implique em desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, bem como a inobservância das normas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES