

QUESTÕES REFERENTES A POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE E MODELOS DE ATENÇÃO À SAÚDE

01– Em relação à Atenção Primária à Saúde, assinale o que for correto.

- 01) Sua prática clínica exige diversas especialidades e uso de recursos tecnológicos e terapêuticos.
- 02) É composta por um conjunto de ações de saúde que, no contexto do SUS, utiliza tecnologias de cuidado de baixa complexidade.
- 04) Se constitui como o primeiro contato de atenção à saúde e deve manter-se isolada física e organizacionalmente dos demais níveis.
- 08) É o nível de atenção à saúde responsável pela gestão e coordenação do cuidado.

02– A territorialização, como base do trabalho da Equipe de Saúde da Família, determina a prática da Vigilância em Saúde. Sobre esse tema, assinale o que for correto.

- 01) A análise do território impede o enfrentamento dos problemas de saúde dada a diversidade cultural.
- 02) A territorialização implica no reconhecimento e mapeamento do território.
- 04) A territorialização contribui para o planejamento em saúde.
- 08) O território em saúde é um espaço geográfico onde as pessoas vivem e trabalham.

03– Identifique os princípios da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e da prática dos trabalhadores na Estratégia Saúde da Família e assinale o que for correto.

- 01) Integralidade, continuidade do cuidado, participação social.
- 02) Acessibilidade, humanização, equidade.
- 04) Universalidade, vínculo, integralidade.
- 08) Transversalidade, unicidade e atendimento de urgência.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

04– Assinale o que for correto. Os indicadores de saúde podem constituir o insumo para o estabelecimento de políticas públicas melhor ajustadas às necessidades da população e, nesse sentido, representam:

- 01) O instrumento utilizado para a gestão da situação de saúde.
- 02) O instrumento que estratifica o risco epidemiológico e identifica áreas críticas.
- 04) A evidência sobre a situação sanitária apenas no município.
- 08) O instrumento que facilita o monitoramento de objetivos e metas em saúde.

05– A respeito dos Conselhos de Saúde, assinale o que for correto.

- 01) Os Conselhos de Saúde foram criados para que a população possa exercer o controle social sobre a gestão da saúde.
- 02) Os Conselhos de Saúde são formados exclusivamente por representantes dos usuários do Sistema Único de Saúde a fim de avaliar a assistência à saúde fornecida à população.
- 04) O controle social é a participação da sociedade no acompanhamento e verificação de ações da gestão pública na execução das políticas públicas, avaliando os objetivos, processos e resultados.
- 08) A Lei nº 8.142/1990 instituiu a formação dos Conselhos de Saúde.

06– Considerando as características da Vigilância Epidemiológica, descritas na Lei nº 8.080/1990, assinale o que for correto.

- 01) A adoção de medidas de prevenção e controle de doenças é parte integrante da Vigilância Epidemiológica.
- 02) A Vigilância Epidemiológica representa o conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção e/ou prevenção de fatores da saúde.
- 04) Vigilância Epidemiológica atua sobre mudanças nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva.
- 08) Vigilância Epidemiológica está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

07- Com relação ao atendimento domiciliar e à internação domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale o que for correto.

- 01) O atendimento e a internação domiciliares são realizados por indicação médica, com concordância do paciente e de sua família.
- 02) No âmbito do SUS, há previsão para o atendimento domiciliar e a internação domiciliar.
- 04) A internação domiciliar visa exclusivamente a atuação da medicina preventiva e será realizada por equipe multidisciplinar.
- 08) Na modalidade do atendimento e internação domiciliares, somente os procedimentos de enfermagem e de fisioterapia podem ser incluídos.

08- Considerando as práticas de financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale o que for correto.

- 01) O Governo Federal é o único responsável pelo financiamento do SUS em todas as instâncias de saúde.
- 02) Na esfera federal, o Ministério da Saúde executa o financiamento do SUS por meio do Fundo Nacional de Saúde.
- 04) O modelo adotado pelo SUS é descentralizado e de gestão compartilhada entre União, Estados e Municípios.
- 08) O uso dos recursos municipais no SUS é fiscalizado pelas equipes de saúde locais.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

09- Em relação aos determinantes sociais de saúde, assinale o que for correto.

- 01) Sabe-se que as condições de vida e trabalho dos indivíduos e grupos da população estão relacionadas com sua situação de saúde.
- 02) Iniquidades em saúde estão vinculadas com as condições sociais da população.
- 04) Ações políticas coordenadas e intersetoriais influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população.
- 08) Indivíduos com baixa escolaridade e acesso restrito a informações têm oportunidades reduzidas de vida com qualidade.

10- Com relação às diretrizes organizativas e aos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale o que for correto.

- 01) A Equidade pressupõe a oferta de ações e serviços de saúde de maneira diferenciada entre segmentos populacionais.
- 02) A Hierarquização privilegia o modelo da pirâmide como forma de constituição dos fluxos assistenciais.
- 04) A Participação Comunitária impede que segmentos sociais auxiliem na definição e na execução de políticas de saúde.
- 08) O princípio da Integralidade orientou a expansão das ações de saúde, incluindo as ações de caráter intersetorial e multiprofissional.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

QUESTÕES ESPECÍFICAS

11- Com relação ao pré-natal de risco habitual, podemos citar várias atuações do enfermeiro na atenção primária. Identifique o que é responsabilidade legal e ética do enfermeiro realizar, segundo o protocolo da rede mãe paranaense 2022, e assinale o que for correto.

- 01) Ausculta dos batimentos cardíofetais.
- 02) Prestar assistência de enfermagem à gestante, identificar problemas e implementar o cuidado.
- 04) Realizar prescrição conforme protocolo municipal ou estadual de suplementação medicamentosa e exames.
- 08) Preenchimento da carteirinha da gestante contendo todas as informações pertinentes.

12- Assinale o que for correto. Após o trabalho de parto e parto, a gestante entra em um período chamado Greemberg ou 3º período pós- parto. Nesse período, o enfermeiro pode suspeitar de hemorragia pós-parto secundária diante dos seguintes indícios:

- 01) Sudorese e taquicardia.
- 02) Sub involução do útero.
- 04) Dor de baixa intensidade.
- 08) Lóquios de aspecto vermelho vivo em grande quantidade.

13- Identifique as alternativas que contêm informações corretas sobre intercorrências que podem acometer mãe e/ou feto, visto à importância do enfermeiro na atuação, avaliação e evolução clínica do parto e do comportamento fetal para poder intervir adequadamente sempre que necessário.

- 01) A oligo hipossistolia resulta em diminuição da frequência com aumento da intensidade das contrações uterinas. O batimento cardíaco fetal deve ser monitorado a cada 1 hora.
- 02) As hemorragias pós-parto precisam ser rastreadas pelo enfermeiro através da avaliação dos lóquios e da quantidade de perda sanguínea nas primeiras 24 horas.
- 04) Diante de sinais de sofrimento fetal, uma das primeiras ações do enfermeiro até a chegada de ajuda, é lateralizar a gestante em decúbito lateral esquerdo.
- 08) Nos casos de desproporção cefalopélvica relativa (quando há inadequação da apresentação fetal), a realização de movimentos rotatórios da pelve estão contra indicados.

14- Identifique as alternativas que atualmente são consideradas não recomendáveis pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde e assinale o que for correto.

- 01) Manobra de Valsava.
- 02) Enema.
- 04) Manobra de kristeller.
- 08) Tricotomia de pelos pubianos.

15- O protocolo de classificação de risco em obstetrícia do Ministério da Saúde (2017) é uma ferramenta de apoio à decisão do enfermeiro frente às emergências e uma linguagem universal para as urgências obstétricas. Seguindo o protocolo, identifique quais dessas queixas ou situações é indicação da cor vermelha na triagem e assinale o que for correto.

- 01) Contrações uterinas.
- 02) Queixas urinárias.
- 04) Sangramento intenso.
- 08) Sinais de choque.

16- Assinale o que for correto. O enfermeiro realiza um papel fundamental durante todo o processo de trabalho de parto natural da gestante. Pensando nisso, o Ministério da Saúde, em 2017, estabeleceu a "Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal", que visa orientar as mulheres e os profissionais de saúde sobre a importância da via de parto, suas indicações e condutas, sempre baseadas em evidências científicas comprovadas e disponíveis. Essa diretriz deverá servir de referência e orientação para a assistência a:

- 01) Gestantes com ruptura prematura de membranas no termo ou imediatamente antes do parto.
- 02) Parturientes que apresentem eliminações de mecônio imediatamente antes ou durante o trabalho de parto.
- 04) Anormalidades ou complicações mais comuns encontradas na assistência ao trabalho de parto e parto em todas as suas fases.
- 08) Recém-nascido normal, imediatamente após o parto e nas primeiras horas de vida.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

17- Sobre o aleitamento materno, assinale o que for correto.

- 01) A OMS recomenda o aleitamento materno por 2 anos ou mais, sendo exclusivo nos primeiros 6 meses.
- 02) Há contraindicação da amamentação em mães que contraíram Covid-19.
- 04) Grande parte do leite de uma mamada é produzida enquanto a criança mama, sob o estímulo da prolactina.
- 08) Para amamentar seu filho, até que ele complete 6 meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a dois descansos, de 2 horas cada um.

18- O protocolo de assistência ao RN do Ministério da Saúde (2014) contempla as ações humanizadas e integrais no momento do nascimento onde todos os estabelecimentos que realizam partos devem seguir. Segundo esse procedimento, assinale o que for correto.

- 01) Para todos os RNs, proceder ao clampeamento do cordão umbilical imediatamente após o nascimento.
- 02) O atendimento do RN consiste na assistência por profissional devidamente capacitado em reanimação neonatal, médico (preferencialmente pediatra ou neonatal) ou profissional de enfermagem (preferencialmente enfermeiro obstetra ou neonatal).
- 04) Mães que apresentarem bico do seio plano ou invertido não devem amamentar logo na primeira hora de vida do RN, aguardando assim a compra de um bico intermediário.
- 08) Para o RN a termo com ritmo respiratório normal, tônus normal e sem líquido meconial, recomenda-se assegurar o contato pele a pele imediato e contínuo, colocando o RN sobre o abdômen ou tórax da mãe de acordo com sua vontade.

19- Entre as ações prestadas, a gestante desde o primeiro momento em que ela entra em um hospital e depois do nascimento do seu filho é fundamental o enfermeiro realizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem. Sobre ela, assinale o que for correto.

- 01) A SAE norteia as atividades de toda a equipe de enfermagem.
- 02) A SAE é a essência da prática de enfermagem.
- 04) O processo de enfermagem deve ser exclusivo dos hospitais particulares.
- 08) A SAE, como objeto da Resolução COFEN 262/200, não é uma atividade privativa do enfermeiro, podendo qualquer profissional executar.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

20- Sobre o teste do pezinho ou triagem neonatal, assinale o que for correto.

- 01) Deve ser realizado em crianças com nascimento menor que 38 semanas e se necessário realizar sua repetição.
- 02) Deve ser realizado preferencialmente 49 horas após o nascimento do RN ou em até 7 dias.
- 04) É um exame preventivo que permite fazer o diagnóstico de doenças congênitas, com sintomatologia inespecífica ou assintomática no período neonatal.
- 08) É um exame tardio que permite fazer diagnóstico de doenças neurotóxicas, com sintomatologia inespecífica ou assintomática no período neonatal.

21- Quanto às principais causas que levam ao ingurgitamento mamário, ou seja, a retenção de leite e distensão alveolar, levando à obstrução do fluxo de leite, assinale o que for correto.

- 01) Esvaziamento incompleto das mamas.
- 02) Sucção incorreta.
- 04) Prematuridade.
- 08) Malformação mamilar.

22- Sobre as principais considerações para o cuidado de enfermagem em saúde mental no puerpério, assinale o que for correto.

- 01) Estabelecimento de vínculo.
- 02) Ética.
- 04) Escuta inativa.
- 08) Registro de informações.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

23- O ciclo gravídico puerperal é marcado por modificações intensas nas dimensões biológica, psicológica e sociocultural. Por isso é fundamental a assistência oferecida à mulher durante este ciclo, sendo a consulta de enfermagem uma estratégia importante. Com base na consulta de enfermagem, assinale o que for correto.

- 01) Tem como objetivo apenas o tratamento das doenças.
- 02) Tem como função identificar os problemas reais e potenciais.
- 04) Traz benefícios para o binômio mãe/filho.
- 08) Tem como função contribuir com a redução dos índices de morbimortalidade materna.

24- A infecção puerperal é uma das principais causas de óbitos maternos no Brasil. Sobre a infecção puerperal, assinale o que for correto.

- 01) A maioria dos processos infecciosos no puerpério é motivada por infecções no trato genital ou na ferida operatória.
- 02) Os sinais vitais, como temperatura, são importantes para caracterização de infecção puerperal.
- 04) As causas extragenitais, como mastite e ingurgitamento mamário, estão relacionadas com infecção puerperal.
- 08) Ocorre apenas no pós-parto imediato.

25- A depressão pós-parto é um transtorno de humor que atinge entre 20% a 29% das puérperas no Brasil. Com relação aos sinais e sintomas da depressão pós-parto, assinale o que for correto.

- 01) Irritabilidade e cansaço.
- 02) Ansiedade e desesperança.
- 04) Dificuldade em cuidar de si e do recém-nascido.
- 08) Ideia de suicídio ou pensamento de morte.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

26- Segundo o Programa de Reanimação Neonatal, da Sociedade Brasileira de Pediatria (2022), assinale o que for correto.

- 01) O emprego da VPP com balão autoinflável e máscara deve ser feito na frequência de 40 a 60 movimentos por minuto de acordo com a regra prática *aperta/solta/solta*.
- 02) Todo recém-nascido, sem vitalidade adequada ao nascer, precisa ser conduzido aos passos iniciais da reanimação: promover calor, posicionar a cabeça em leve extensão, aspirar vias áreas (se necessário) e secar o recém-nascido.
- 04) A temperatura da sala onde serão realizados os procedimentos de reanimação deve ser estabelecida, a fim de evitar hipotermia do recém-nascido.
- 08) O clampeamento oportuno do cordão umbilical tem definição variável na literatura, com mínimo de 60 segundos até alguns minutos ou até cessar a pulsação do mesmo.

27- As taxas de infecção de sítio cirúrgico (ISC) por cesariana no Brasil são consideradas altas e constitui questão importante na assistência puerperal pela morbimortalidade associada. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) Os principais fatores de risco para ISC são idade, estado nutricional, diabetes, obesidade, excesso de toques vaginais.
- 02) A identificação correta dos casos de ISC permite eficientes técnicas relacionadas à assistência.
- 04) Má higiene cutânea e tempo de ruptura das membranas não são fatores de risco para ISC.
- 08) Orientações de cuidados na limpeza da incisão cirúrgica da mulher na alta, não reduzem a probabilidade de ISC.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

28- A hemorragia pós-parto (HPP) tem um diagnóstico fácil, tendo em vista que ela é bem perceptível para o profissional de saúde, exceto quando há acúmulo de sangue dentro da cavidade uterina. Quanto às principais causas de HPP, assinale o que for correto.

- 01) Tipo de parto e infecção pós-parto.
- 02) Anemia e episiorrafia.
- 04) Atonia uterina, trauma no canal de parto.
- 08) Tecido placentário retido, coagulopatias.

29- Sobre as fissuras mamilares, assinale o que for correto.

- 01) São definidas como solução de continuidade linear, de extensão e profundidade variáveis, podendo atingir a derme, localizada no mamilo ou área de junção areolomamilar.
- 02) As fissuras não são fatores desencadeantes do desmame precoce.
- 04) As fissuras são comuns e não causam dor na amamentação.
- 08) Uma das principais medidas de prevenção é manter as mamas secas.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

30- Sobre a pré-eclâmpsia e eclâmpsia, assinale o que for correto.

- 01) No pós-parto, após 48 horas, a crise convulsiva caracteriza a pré-eclâmpsia.
- 02) A eclâmpsia caracteriza-se pela observação de hipertensão e convulsão.
- 04) A pré-eclâmpsia caracteriza-se pela observação da hipertensão e proteinúria.
- 08) A eclâmpsia não é desencadeada no puerpério.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES