

INSTRUÇÕES QUANTO AO PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS

1. A prova é elaborada com questões de alternativas múltiplas;
2. Cada questão contém **4 (quatro) alternativas**, indicadas com os números **01, 02, 04 e 08**;
3. O valor a ser assinalado no cartão de respostas será a soma dos números correspondentes às alternativas corretas. Cada questão pode ter uma, duas, três ou quatro alternativas corretas;
4. No local próprio do cartão de respostas, deve ser assinalado o valor numérico do somatório encontrado, obrigatoriamente com dois algarismos. Em questões com somatório entre os intervalos 01 e 09, o algarismo zero da casa decimal deve ser preenchido (exemplo: 06);
5. A atribuição de pontos só será feita quando o valor numérico assinalado incluir pelo menos **uma alternativa correta** e **nenhuma alternativa errada**. Portanto, a pontuação integral ou parcial de uma questão só será computada se o somatório apresentado **não incluir alternativa(s) errada(s)**.

Suponha a questão hipotética número 65, representada abaixo. Você identificou duas alternativas corretas na questão, a saber:

65 – Enunciado da questão, assinale o que for correto.

- 01) **Alternativa correta.** ✓
02) Alternativa errada.
04) Alternativa errada.
08) **Alternativa correta.** ✓

09

A soma das duas alternativas corretas (**01 + 08**) será igual a **09**.

No **Cartão de Respostas**, o campo referente à questão 65 deve ser **preenchido da maneira indicada ao lado**.

CARTÃO DE RESPOSTAS

65	
<input checked="" type="checkbox"/>	0
<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
	4
	5
	6
	7
	8
<input checked="" type="checkbox"/>	



Agora suponha a questão hipotética número 70, representada abaixo. Você identificou três alternativas corretas na questão, a saber:

70 – Enunciado da questão, assinale o que for correto.

- 01) Alternativa errada.
02) **Alternativa correta.** ✓
04) **Alternativa correta.** ✓
08) **Alternativa correta.** ✓

14

A soma das três alternativas corretas (**02 + 04 + 08**) será igual a **14**.

No **Cartão de Respostas**, o campo referente à questão 70 deve ser **preenchido da maneira indicada ao lado**.

CARTÃO DE RESPOSTAS

70	
<input type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
<input checked="" type="checkbox"/>	
	5
	6
	7
	8
	9



QUESTÕES REFERENTES A POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE E MODELOS DE ATENÇÃO À SAÚDE

01- Modelos assistenciais são a forma como a assistência à saúde é organizada. Eles podem variar muito ao longo do tempo e espaço em que estão inseridos, de acordo com as mudanças que ocorrem na sociedade como um todo. No Brasil, ao longo da história, devido às transformações sociais, históricas e políticas, vários modelos assistenciais tiveram ascensão e declínio. Sobre esse tema, assinale o que for correto.

- 01) O modelo sanitarista é essencialmente constituído de campanhas de saúde, programas especiais e vigilâncias, tendo como principais exemplos de sua atividade: vacinação, controle de epidemias e erradicação de endemias.
- 02) O Modelo de Campanhas Sanitárias e Programas Especiais consiste em uma combinação entre disciplinas biológicas e epidemiológicas, resultando em uma atenção voltada para certas doenças e riscos ou determinados grupos populacionais.
- 04) O modelo de atenção gerenciada está fundamentado a partir da análise de custo-benefício e custo-efetividade e na medicina baseada em evidências.
- 08) O modelo hegemônico privilegia as demandas espontâneas da população com atendimento médico unicamente, privilegiando a medicina curativa e estimulando o consumismo médico.

02- O Médico Oswaldo Cruz teve um importante papel na Saúde Pública Brasileira e no desencadeamento da Revolta da vacina. Sobre esse assunto, assinale o que for correto.

- 01) A lei que determinava a obrigatoriedade da imunização foi revogada em 16 de novembro de 1904, quando também foi decretado o estado de sítio no Rio de Janeiro, porém o Brasil só conseguiu erradicar a peste bubônica em 1971.
- 02) Oswaldo Cruz se formou no Instituto Pasteur, na França, e em pouco tempo como Diretor Geral de Saúde Pública conseguiu controlar a febre amarela na cidade do Rio de Janeiro, por meio da limpeza de focos de mosquitos vetores e o isolamento de pessoas doentes nos hospitais.
- 04) A Revolta da Vacina foi um motim popular ocorrido entre 10 e 16 de novembro de 1904 na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil e o estopim da rebelião popular foi uma lei que determinava a obrigatoriedade de vacinação contra a peste bubônica.
- 08) O médico Oswaldo Cruz ficou encarregado do saneamento da cidade do Rio de Janeiro, assumindo a Diretoria Geral de Saúde Pública (DGSP) com a intenção de enfrentar a febre amarela, a varíola e a peste bubônica.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

03- A Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Sobre essa lei e suas atualizações, assinale o que for correto.

- 01) A execução de ações de saúde bucal foi incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde pela Lei nº 14.572 de 2023, sendo de competência da direção nacional do SUS definir as diretrizes e as normas para a estruturação física e organizacional dos serviços de saúde bucal.
- 02) A Lei nº 14.510 de 2022 alterou a Lei orgânica da saúde para autorizar e disciplinar a prática da tele-saúde em todo o território nacional, que se refere a modalidade de prestação de serviços de saúde a distância, por meio da utilização das tecnologias da informação e da comunicação, que envolve, entre outros, a transmissão segura de dados e informações de saúde, por meio de textos, de sons, de imagens ou outras formas adequadas.
- 04) O princípio da organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, foi inserido, entre os princípios do Sistema Único de Saúde pela Lei nº 13.427 de 2017, garantindo, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras.
- 08) O subsistema de atenção à saúde do idoso foi incluído na Lei Orgânica da Saúde pela Lei 13.980 de 2021, o qual prevê ações e serviços de saúde voltados para o atendimento dessa população específica, em todo território nacional, coletiva ou individualmente, tendo em vista suas fragilidades e iniquidades.

04- Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde diversos fatores determinantes e condicionantes. Sobre esse assunto, assinale o que for correto.

- 01) Políticas de inclusão social que visem melhores condições de moradia, trabalho e renda da população tem impacto direto na melhoria da sua situação de saúde.
- 02) Políticas sociais relacionadas à atividade física e lazer exercem pouca ou nenhuma influência na situação de saúde da população, pois os fatores individuais e hereditários são mais importantes no processo saúde-doença.
- 04) Políticas públicas de combate à fome e à insegurança alimentar são essenciais para garantia da promoção e proteção da saúde da população.
- 08) A lei orgânica da saúde estabelece como sendo fatores determinantes e condicionantes da saúde, dentre outros, o acesso à cultura, justiça, saneamento básico, bens e serviços essenciais e igualdade étnico-racial.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

05- A Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS) foi instituída por meio da Resolução nº 588/2018 do Conselho Nacional de Saúde. A PNVS é um documento norteador do planejamento das ações de vigilância em saúde nas três esferas de gestão do SUS, caracterizado pela definição das responsabilidades, princípios, diretrizes e estratégias dessa vigilância. Sobre esse assunto, assinale o que for correto.

- 01) É responsabilidade da União, e compete ao Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Vigilância em Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) executar as ações de vigilância de forma complementar a atuação dos Municípios.
- 02) É responsabilidades dos Municípios, e compete às Secretarias de Saúde, promover, fortalecer e articular a atuação dos Centros de Informação e Assistência Toxicológica no apoio técnico a profissionais de saúde e a pessoas expostas ou intoxicadas por substâncias químicas e medicamentos ou acidentes com animais peçonhentos.
- 04) PNVS deve contribuir para a integralidade na atenção à saúde, o que pressupõe a inserção de ações de vigilância em saúde em todas as instâncias e pontos da Rede de Atenção à Saúde do SUS.
- 08) Detectar, monitorar e responder às emergências em saúde pública, observando o Regulamento Sanitário Internacional, e promover estratégias para implementação, manutenção e fortalecimento das capacidades básicas de vigilância em saúde são diretrizes da PNVS.

06- Assinale o que for correto. São diretrizes da Política Nacional de Atenção Hospitalar:

- 01) Garantia da qualidade da atenção hospitalar e segurança do paciente.
- 02) Continuidade do cuidado por meio da articulação do hospital com os demais pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde.
- 04) Modelo de atenção centrado no cuidado ao usuário, de forma multiprofissional e interdisciplinar.
- 08) Financiamento bipartite, articulado entre estados e municípios.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

07- Assinale as alternativas que apresentam diretrizes da Rede de Atenção às Urgências.

- 01) Centralização do atendimento às urgências com independência das diversas redes de atenção e acesso livre aos serviços de saúde.
- 02) Ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos demandados aos serviços de saúde em todos os pontos de atenção, contemplando a classificação de risco e intervenção adequada e necessária aos diferentes agravos.
- 04) Garantia de implantação de modelo de atenção de caráter multiprofissional, compartilhado por trabalho em equipe, instituído por meio de práticas clínicas cuidadoras e baseado na gestão de linhas de cuidado.
- 08) Articulação interfederativa entre os diversos gestores desenvolvendo atuação solidária, responsável e compartilhada.

08- A Rede Cegonha consiste numa rede de cuidados que visa assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento saudáveis. Sobre ela, assinale o que for correto.

- 01) A Rede Cegonha tem como princípios, entre outros: o respeito, a proteção e a realização dos direitos humanos; o respeito à diversidade cultural, étnica e racial; a promoção da equidade e o enfoque de gênero.
- 02) São diretrizes da Rede Cegonha: garantia do acolhimento com avaliação e classificação de risco e vulnerabilidade, ampliação do acesso e melhoria da qualidade do pré-natal; garantia de vinculação da gestante à unidade de referência e ao transporte seguro; garantia das boas práticas e segurança na atenção ao parto e nascimento; garantia da atenção à saúde das crianças de zero a vinte e quatro meses com qualidade e resolutividade; e garantia de acesso às ações do planejamento reprodutivo.
- 04) São objetivos da Rede Cegonha garantir a integralidade do cuidado no pré-natal, na gravidez, na perda gestacional, no parto e, no puerpério, bem como ao recém-nascido e à criança, com foco na resolutividade da atenção primária e da atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e zelar a morbimortalidade materna e infantil.
- 08) A Rede Cegonha deve ser organizada de maneira a possibilitar o provimento contínuo de ações de atenção à saúde materna e infantil para a população de determinado território, mediante a articulação dos distintos pontos de atenção à saúde, do sistema de apoio, do sistema logístico e da governança da rede de atenção à saúde.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

09- O Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica objetiva propiciar acesso a medicamentos aos usuários com doenças de perfil endêmico e que tenham impacto socioeconômico. Esses medicamentos são gerenciados e disponibilizados aos usuários portadores de doenças que configuram problemas de saúde pública através de Programas Estratégicos, que seguem protocolos e normas específicas. Assinale as alternativas que apresentam apenas problemas de saúde considerados como estratégicos e com cobertura no Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica.

- 01) Doença de chagas.
- 02) Artrite reumatoide.
- 04) Tuberculose.
- 08) Hanseníase.

10- Donabedian, na década de 1960, propôs um modelo de avaliação composto por estrutura-processo-resultado. Em relação à avaliação de serviços de saúde proposto por Donabedian, assinale o que for correto.

- 01) Qualidade pode ser medida como o ponto em que o cuidado prestado atinge o equilíbrio mais favorável entre os riscos e benefícios.
- 02) Estrutura correspondem aos insumos, recursos físicos, instalações, equipamentos, mão de obra, manuais de normas/rotinas e procedimentos.
- 04) Resultado corresponde às execuções de ações mediante o uso de protocolos assistenciais, procedimentos, regras, padrões.
- 08) Processo corresponde a avaliação do êxito dos objetivos do cuidado em saúde e satisfação do usuário ou da população.

QUESTÕES ESPECÍFICAS

11- Sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), assinale o que for correto.

- 01) Está legalmente formalizada por meio da Resolução 358/2009 do COFEN.
- 02) A SAE organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de enfermagem.
- 04) A SAE e o processo de enfermagem são termos diferentes que configuram a mesma situação do processo de trabalho do enfermeiro.
- 08) A SAE e o processo de enfermagem são processos de trabalho distintos do enfermeiro, compreendendo habilidades técnicas e científicas específicas para cada atividade.

12- Considerando que o processo de enfermagem é reconhecido como um processo metodológico que orienta o cuidado profissional de enfermagem, bem como a documentação da prática assistencial, assinale o que for correto.

- 01) O processo de enfermagem deve ser aplicado de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes públicos ou privados, onde ocorra o cuidado profissional de enfermagem, sendo considerados ambientes: internações, ambulatórios, domicílios, escolas, associações comunitárias, fábricas, entre outros.
- 02) O processo de enfermagem está organizado, segundo a Resolução do COFEN de 2009, em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes.
- 04) O processo de enfermagem deve estar pautado em um suporte teórico (teoria de enfermagem) para nortear as etapas do processo de enfermagem.
- 08) O processo de enfermagem é composto pelas seguintes etapas: avaliação, diagnóstico, resultado esperado, síntese de resultados e planejamento.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

13- Sobre diagnóstico de enfermagem, assinale o que for correto.

- 01) É considerado um ato privativo do enfermeiro.
- 02) Para nomear os diagnósticos de enfermagem existem diferentes taxonomias e sistemas de classificação que representam a terminologia própria da enfermagem, sendo as mais conhecidas: NANDA-I e a CIPE® (Classificação Internacional para a prática de enfermagem), sendo recomendada a utilização da CIPE® pela Organização Mundial da Saúde e pelo Conselho Internacional de Enfermeiros (CIE) por se tratar de um conjunto de termos que padronizam a linguagem da enfermagem em âmbito mundial.
- 04) Os diagnósticos de enfermagem referem-se apenas à pessoa doente, desconsiderando a família e a coletividade humana.
- 08) Os diagnósticos de enfermagem têm como foco a doença da pessoa, tratando-se exclusivamente dos aspectos biológicos do ser humano.

14- Tratando-se de dimensionamento de enfermagem em uma unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal, assinale o que for correto.

- 01) A escala de enfermagem deve ser ajustada a cada turno, conforme a necessidade dos pacientes que estão internados no momento.
- 02) Além de um enfermeiro coordenador com especialidade em cuidados de pacientes graves (neonatais ou pediátricos), considera-se no dimensionamento: enfermeiros assistenciais (no mínimo 01 para cada 08 leitos ou fração, em cada turno) e técnicos de enfermagem (no mínimo 01 para cada 02 leitos em cada turno, além de 1 técnico de enfermagem por UTI para serviços de apoio assistencial em cada turno).
- 04) Para dimensionar os cuidados de enfermagem em uma unidade de terapia intensiva, deve-se antes de tudo classificar os pacientes em cuidados mínimos, máximos e intermediários, sendo que os funcionários com maior experiência devem ser direcionados aos pacientes com cuidados máximos.
- 08) O dimensionamento de equipe de enfermagem para pacientes intensivos está descrita na seção III, da Resolução nº 7, de 24 de fevereiro de 2010.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

15- A ética em enfermagem é fator crucial que deve ser exercido diariamente no cuidado direto, indireto e nas relações profissionais. Neste contexto, assinale o que for correto.

- 01) A ética é empregada em diversas situações do cotidiano (a exemplo: na política, nas relações interpessoais, na educação, no trabalho) e deve ser vista como parte essencial da política da organização e imprescindível para o desenvolvimento e crescimento institucional uma vez que a seus valores humanizam seus processos de trabalhos e a relação com os clientes traz benefícios para a própria empresa e para a sociedade.
- 02) Os códigos de ética integram a legislação que regulamenta a profissão, os princípios nele expostos têm valor de lei e os infratores podem ser punidos pelos respectivos Conselhos Regionais e Federais.
- 04) O atual Código de ética em enfermagem publicada por meio da Resolução COFEN nº 564/2017, norteia-se por princípios fundamentais, que representam imperativos para a conduta profissional; tem como responsabilidades a promoção e a restauração da saúde, a prevenção de agravos e doenças e o alívio do sofrimento; considera a remuneração justa e a condições adequadas de trabalho, que possibilitem um cuidado profissional seguro e livre de danos.
- 08) As penalidades a serem impostas pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, são as seguintes: advertência verbal; Multa; Censura; Suspensão do Exercício Profissional; Cassação do direito ao Exercício Profissional.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

16- Sobre a ocorrência de quedas em idosos, assinale o que for correto.

- 01) Anamnese e exame físico adequados realizados pelo enfermeiro após uma queda aumentam as chances de identificação de condições clínicas modificáveis e consequente redução de taxas de internação da pessoa idosa.
- 02) No manejo de fatores de risco modificáveis para quedas, deve-se estimular o uso de medicamentos antidepressivos, ansiolíticos e antipsicóticos quanto possível, uma vez que reduzem a ansiedade do idoso quanto a novos eventos de quedas.
- 04) Na avaliação do ambiente doméstico, para diminuir o risco de queda, são úteis a remoção da desordem para reduzir o risco de tropeções, a verificação de iluminação adequada e a instalação de medidas de segurança como barras de apoio no chuveiro ou assentos sanitários mais altos.
- 08) A realização de exames laboratoriais como hemograma, bem como dosagem de TSH, vitamina B12 e vitamina D são importantes para excluir condições clínicas que podem estar favorecendo a ocorrência de quedas.

17- Acerca da assistência de enfermagem ao paciente idoso com delirium, assinale o que for correto.

- 01) A característica patognomônica do delirium é uma alteração aguda no estado mental basal durante horas a dias.
- 02) O idoso com delirium costuma ter evolução flutuante durante o decorrer do dia, com incapacidade variável de concentração, manutenção da atenção e manutenção de um comportamento propositado.
- 04) Muitas vezes, o delirium é o único sinal de uma condição médica grave subjacente, sobretudo em pessoas mais velhas e frágeis ou que têm uma demência subjacente.
- 08) O delirium é uma síndrome clínica com baixa prevalência, evitável e considerada fator de risco para piores prognósticos de saúde em idosos enfermos.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

18- Sobre os cuidados de enfermagem relacionados à saúde mental, assinale o que for correto.

- 01) A comunicação terapêutica, como uma interação interpessoal entre o enfermeiro e o cliente, pode orientar o cliente para a identificação de um plano de ação, em busca de uma resolução satisfatória e socialmente aceitável para suas necessidades.
- 02) Com base na Resolução 599/2018, compete ao enfermeiro em sua assistência em saúde mental e como consequência a pacientes psicóticos, prescrever cuidados de enfermagem voltados à saúde do indivíduo, exceto os com esquizofrenia.
- 04) São exemplos de ações de enfermagem no CAPS: triagem, anamnese, visita domiciliar, participação na elaboração do projeto terapêutico singular e atendimento a familiares.
- 08) A Reforma Psiquiátrica brasileira é resultante de um processo já totalmente finalizado, o qual baseou-se na premissa de que o paciente deve ser tratado à parte de seu meio social.

19- Sobre o uso de medicamentos, assinale o que for correto.

- 01) As velocidades de metabolização dos fármacos podem variar acentuadamente de uma pessoa para outra, devido a fatores como idade e interação com outras medicações utilizadas.
- 02) Fatores como senectude, diversas comorbidades e polifarmácia favorecem o risco de interações medicamentosas, bem como uso de medicamentos potencialmente inapropriados em pacientes idosos.
- 04) Pela via subcutânea, o agente terapêutico é introduzido logo abaixo da epiderme, por onde são introduzidos agentes terapêuticos que necessitam ser absorvidos rapidamente e com uma ação contínua.
- 08) A excreção de fármacos pelo organismo dá-se por meio de rins, pulmões, suor, glândulas lacrimais, salivares e mamas, fezes e secreção biliar. Entre todos, as fezes têm maior importância na função excretora.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

20- Quanto à assistência de enfermagem ao paciente hospitalizado, assinale o que for correto.

- 01) O pulso, decorrente de alterações da pressão intravascular arterial, é uma medida indireta do débito cardíaco, e caracteriza-se por um fluxo periódico, reflexo da frequência dos batimentos cardíacos, mensurado em batimentos por minuto (bpm).
- 02) A aferição da PA tem um papel importante no diagnóstico e controle da hipertensão arterial e da hipotensão ortostática, podendo sofrer interferência de alguns fatores como a ingestão de grande quantidade de alimentos, exercício físico extenuante, tabagismo, ingestão de cafeína e plenitude vesical.
- 04) A dermatite amoniaca é uma condição inflamatória frequente em bebês e idosos e que torna a pele mais vulnerável a infecções, como a candidíase.
- 08) São cuidados de enfermagem importantes ao paciente estomizado: troca periódica do equipamento coletor, avaliação de região periestomal, orientações quanto a técnicas de autocuidado, como esvaziamento do equipamento, controle de gases, banho e limpeza da pele.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

21- As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) são complicações frequentes decorrentes à atenção à saúde do paciente em qualquer ambiente assistencial. Essas infecções representam importante ameaça à segurança dos pacientes pelo mundo, responsáveis por considerável aumento nas taxas de morbimortalidade e nos custos da assistência e a Organização Mundial da Saúde (OMS) relata que cerca de 15% das (IRAS) são decorrentes dos cuidados de atenção à saúde do paciente. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA/BRASIL, 2023), revisou os principais critérios diagnósticos de (IRAS) para guiar e uniformizar os serviços de controle de infecções e equipe assistencial. Assinale o que for correto referente à temática.

- 01) Entre os tipos mais comuns de IRAS, são apenas as infecções de corrente sanguínea (ICS) e do sítio cirúrgico (ISC).
- 02) É considerado infecção do trato urinário em paciente com cateter vesical de demora (ITU-AC) quando for instalado por um período maior que dois dias consecutivos (sendo que o D1 é o dia da instalação do cateter) e, na data da infecção, o paciente estava com o cateter instalado ou este havia sido removido no dia anterior.
- 04) Infecções relacionadas a procedimentos cirúrgicos (ISC), com ou sem colocação de implantes, em pacientes internados ou ambulatoriais, a data da infecção corresponde após 72 horas da realização do procedimento cirúrgico.
- 08) Define-se infecção de corrente sanguínea (ICS) secundária quando ocorrer a identificação em hemocultura de microrganismo infeccioso na corrente sanguínea que está associado a um outro foco infeccioso específico. Neste caso, a infecção de corrente sanguínea é secundária a outro foco infeccioso específico, que é o foco primário da infecção.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

22- Pacientes com suspeita ou confirmação diagnóstica de infecção ou colonização com agentes infecciosos de alta transmissibilidade ou importância epidemiológica aumentam o risco de transmissão para outros pacientes, profissionais de saúde e acompanhantes. As medidas de precauções (padrão e específicas), constituem a base das melhores práticas para evitar a transmissão. As precauções específicas ou medidas de precaução e isolamento são aquelas baseadas no modo de transmissão - contato, gotículas e aerossóis, visam garantir a prevenção e disseminação de microrganismos nos serviços de saúde. Frente esta temática, assinale o que for correto.

- 01) Ao avaliar os pacientes com suspeita ou diagnóstico de varicela, o profissional não necessita usar EPI (luvas, avental e máscara N95).
- 02) As precauções de gotículas e aerossóis devem ser instituídas empiricamente quando houver suspeita de agente etiológico de acordo com o modo de transmissão, considerando os sinais e sintomas, enquanto se aguarda a confirmação diagnóstico.
- 04) São consideradas medidas de precaução padrão: higiene das mãos, uso de EPIs (luvas, avental, máscara, óculos protetores); tosse com etiqueta, higiene ambiental, cuidado com material perfurocortante, aplicados a todos os pacientes.
- 08) Para o atendimento de paciente em precaução por aerossóis, o profissional de saúde deve colocar máscara cirúrgica ou N95%/PFF2 ao entrar no quarto do paciente.

23- A segurança do paciente constitui uma das mais atuais e desafiantes áreas de intervenção em sistemas de saúde. No Brasil, em 2013 houve a implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de desenvolver medidas preventivas para evitar erros relacionados à atenção à saúde. A Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, criada em 2004 e a Organização Mundial da Saúde (OMS) propôs 6 (seis) metas globais para alcançar a qualidade do atendimento e destas, uma se refere melhorar a adesão de higiene das mãos com a finalidade de reduzir riscos de aquisição de infecções pelos pacientes. Quanto aos momentos da higienização das mãos, identifique o que todo profissional de saúde deve realizar e assinale o que for correto.

- 01) Sem indicação de higienizar as mãos após contato com áreas próximas do paciente.
- 02) Antes da realização de procedimentos assépticos.
- 04) Após risco de exposição a fluidos corporais e após contato com o paciente.
- 08) Antes do contato com o paciente.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

24- Em relação à Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS) no recém-nascido, assinale o que for correto.

- 01) A infecção neonatal tardia ocorre após as primeiras 48 horas de vida, diagnosticada enquanto o neonato estiver internado em unidade de assistência neonatal ou após alta hospitalar, de acordo com o início da manifestação clínica.
- 02) O aumento da necessidade da oferta de oxigênio, radiografias de tórax seriadas com a identificação de consolidação, temperatura axilar acima de 37,5 °C, escore hematológico com 3 parâmetros alterados e taquicardia, são achados clínicos que sugerem que o recém-nascido apresenta pneumonia clínica.
- 04) Bolsa rota maior ou igual a 18 horas, cerclagem, colonização pelo estreptococo B em gestante e coroamionite são alguns dos fatores de risco para que ocorra IRAS neonatal tardia.
- 08) A posição supina, imobilização devido a trauma ou doença, uso prolongado de ventilação mecânica com exposição a dispositivos respiratórios e contato com mãos contaminadas ou colonizadas são fatores que favorecem o desenvolvimento de pneumonia relacionada à assistência à saúde.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

25- O nascimento prematuro está associado ao elevado risco de mortalidade neonatal. Segundo a Organização Mundial de Saúde, anualmente nascem cerca de 15 milhões de prematuros em todo o mundo e uma das principais complicações refere-se a sepse neonatal, uma condição multissistêmica de origem bacteriana, viral ou fúngica, sendo importante causa de morbidade e mortalidade. Assinale o que for correto referente à temática.

- 01) Na suspeita de sepse neonatal precoce, recomenda-se iniciar antibioticoterapia empírica após a coleta de hemocultura. O diagnóstico de choque séptico no recém-nascido é clínico, e não se deve aguardar nenhum tipo de confirmação laboratorial para iniciar o manejo imediato de tratamento.
- 02) O isolamento de microorganismos por hemocultura é o método que realmente confirma o diagnóstico de infecção de corrente sanguínea, de acordo com os critérios diagnósticos pré-estabelecidos.
- 04) Durante o parto, sempre que houver suspeita ou diagnóstico de infecção intra-amniótica e quando houver febre materna inexplicada isoladamente, deve ser feita a antibioticoterapia intraparto.
- 08) Prematuridade, baixo peso ao nascer, uso prolongado de antibióticos e procedimentos invasivos constituem fatores de risco para a sepse neonatal tardia. Reconhecer esses fatores de risco, o quadro clínico e tratar precocemente a sepse neonatal aumenta a sobrevivência dos recém-nascidos.

26- Dos destaques das diretrizes de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) 2020 da American Heart Association, assinale o que for correto no algoritmo de atendimento ao adulto frente a constatação de Fibrilação Ventricular/Taquicardia Ventricular (FV/TV).

- 01) Deve-se preconizar a desfibrilação elétrica assim que for identificada a arritmia (Bifásico 120-200J e Monofásico 360J).
- 02) A Epinefrina 1 mg deverá ser administrada após o segundo choque.
- 04) Após os choques deverão ser retomadas imediatamente a RCP (100/120 compressões e 5 cm de profundidade).
- 08) 300mg de Amiodarona deverão ser administradas em bolus após o terceiro (3º) choque.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

27- Conforme consenso da NPUAP - National Pressure Ulcer Advisory Panel Press Release de abril 2016, adaptado pela Associação Brasileira de Estomatoterapia, assinale o que for correto para o sistema de classificação das lesões por pressão e suas características.

- 01) Lesão por pressão Estágio 4: Perda da pele em sua espessura total e perda tissular com exposição ou palpação direta da fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou osso.
- 02) Lesão por Pressão Estágio 3: Perda da pele em sua espessura total na qual a gordura é visível e, frequentemente, tecido de granulação e epíbole estão presentes.
- 04) Lesão por Pressão Não Classificável: Perda da pele em sua espessura total e perda tissular na qual a extensão do dano não pode ser confirmada porque está encoberta pelo esfacelo ou escara.
- 08) Lesão por pressão Estágio 2: Presença de eritema que embranquece ou mudanças na sensibilidade, temperatura ou consistência (endurecimento) podem preceder as mudanças visuais.

28- Dos destaques das diretrizes de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) 2020 da American Heart Association, assinale o que for correto no algoritmo de atendimento ao adulto frente a constatação de Atividade Elétrica Sem Pulso (AESP) ou Assistolia.

- 01) Epinefrina 1mg IV/IO imediatamente na constação do PCR.
- 02) A Hipoglicemia é uma das causas reversíveis que deve ser cogitada nos 5Hs e 5Ts.
- 04) Epinefrina 1mg IV/IO a cada 03 a 05 minutos.
- 08) A relação compressão-ventilação sem via aérea definitiva deverá ser 30:2.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

29- Frente aos cuidados com paciente neurocítico, vítima de traumatismo craniano grave, assinale o que for correto frente a identificação e caracterização da Tríade de Cushing e como é realizado o cálculo de Pressão de Perfusão Cerebral (PPC) encontrada na hipertensão intracranica (HIC).

- 01) Tríade de Cushing é definida como: Alteração Pupilar, Arritmia Respiratória e Hipotensão.
- 02) Tríade de Cushing é definida como: Bradicardia, Arritmia Respiratória e Hipertensão.
- 04) PPC= Pressão Arterial Média (PAM) – Pressão de Fluxo Sanguíneo Cerebral (FSC), ou seja, PPC=PAM-FSC.
- 08) PPC= Pressão Arterial Média (PAM) – Pressão Intracranica (PIC) ou seja PPC=PAM-PIC.

30- Assinale o que for correto frente aos principais critérios diagnósticos e fatores precipitantes da Cetoacidose Diabética (CAD) de acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2023.

- 01) Glicemia acima de 200mg/dL; Acidose Metabólica pH venoso < 7,3 ou bicarbonato sérico < 15 mEq/L; cetonúria maior ou igual a 2 + nas tiras reagentes; cetonemia maior ou igual a 3mmol/L.
- 02) Infecções; Descontinuação do uso de insulina; Abuso de álcool e cocaína; Trauma; Infarto agudo do miocárdio; Medicamentos tais como glicocorticoides.
- 04) Glicemia acima de 400mg/dL; Acidose Metabólica pH arterial < 6,9 ou bicarbonato sérico < 12 mEq/L; cetonúria maior ou igual a 4 + nas tiras reagentes.
- 08) Descontinuidade no uso de hipoglicemiantes orais; Infecções; Traumas, Embolia Pulmonar; Gestação.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

