



## INSTRUÇÕES QUANTO AO PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS

1. A prova é elaborada com questões de alternativas múltiplas;
2. Cada questão contém **4 (quatro) alternativas**, indicadas com os números **01, 02, 04 e 08**;
3. O valor a ser assinalado no cartão de respostas será a soma dos números correspondentes às alternativas corretas. Cada questão pode ter uma, duas, três ou quatro alternativas corretas;
4. No local próprio do cartão de respostas, deve ser assinalado o valor numérico do somatório encontrado, obrigatoriamente com dois algarismos. Em questões com somatório entre os intervalos 01 e 09, o algarismo zero da casa decimal deve ser preenchido (exemplo: 06);
5. A atribuição de pontos só será feita quando o valor numérico assinalado incluir pelo menos **uma alternativa correta** e **nenhuma alternativa errada**. Portanto, a pontuação integral ou parcial de uma questão só será computada se o somatório apresentado **não incluir alternativa(s) errada(s)**.

Suponha a questão hipotética número 65, representada abaixo. Você identificou duas alternativas corretas na questão, a saber:

**65** – Enunciado da questão, assinale o que for correto.

- 01) **Alternativa correta.** ✓  
02) Alternativa errada.  
04) Alternativa errada.  
08) **Alternativa correta.** ✓

**09**

A soma das duas alternativas corretas (**01 + 08**) será igual a **09**.

No **Cartão de Respostas**, o campo referente à questão 65 deve ser **preenchido da maneira indicada ao lado**.

### CARTÃO DE RESPOSTAS

65	
<input checked="" type="checkbox"/>	0
<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
<input type="checkbox"/>	4
<input type="checkbox"/>	5
<input type="checkbox"/>	6
<input type="checkbox"/>	7
<input type="checkbox"/>	8
<input checked="" type="checkbox"/>	



Agora suponha a questão hipotética número 70, representada abaixo. Você identificou três alternativas corretas na questão, a saber:

**70** – Enunciado da questão, assinale o que for correto.

- 01) Alternativa errada.  
02) **Alternativa correta.** ✓  
04) **Alternativa correta.** ✓  
08) **Alternativa correta.** ✓

**14**

A soma das três alternativas corretas (**02 + 04 + 08**) será igual a **14**.

No **Cartão de Respostas**, o campo referente à questão 70 deve ser **preenchido da maneira indicada ao lado**.

### CARTÃO DE RESPOSTAS

70	
<input type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	5
<input type="checkbox"/>	6
<input type="checkbox"/>	7
<input type="checkbox"/>	8
<input type="checkbox"/>	9



**QUESTÕES REFERENTES A POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE E MODELOS DE ATENÇÃO À SAÚDE**

**01-** Modelos assistenciais são a forma como a assistência à saúde é organizada. Eles podem variar muito ao longo do tempo e espaço em que estão inseridos, de acordo com as mudanças que ocorrem na sociedade como um todo. No Brasil, ao longo da história, devido às transformações sociais, históricas e políticas, vários modelos assistenciais tiveram ascensão e declínio. Sobre esse tema, assinale o que for correto.

- 01) O modelo sanitarista é essencialmente constituído de campanhas de saúde, programas especiais e vigilâncias, tendo como principais exemplos de sua atividade: vacinação, controle de epidemias e erradicação de endemias.
- 02) O Modelo de Campanhas Sanitárias e Programas Especiais consiste em uma combinação entre disciplinas biológicas e epidemiológicas, resultando em uma atenção voltada para certas doenças e riscos ou determinados grupos populacionais.
- 04) O modelo de atenção gerenciada está fundamentado a partir da análise de custo-benefício e custo-efetividade e na medicina baseada em evidências.
- 08) O modelo hegemônico privilegia as demandas espontâneas da população com atendimento médico unicamente, privilegiando a medicina curativa e estimulando o consumismo médico.

**02-** O Médico Oswaldo Cruz teve um importante papel na Saúde Pública Brasileira e no desencadeamento da Revolta da vacina. Sobre esse assunto, assinale o que for correto.

- 01) A lei que determinava a obrigatoriedade da imunização foi revogada em 16 de novembro de 1904, quando também foi decretado o estado de sítio no Rio de Janeiro, porém o Brasil só conseguiu erradicar a peste bubônica em 1971.
- 02) Oswaldo Cruz se formou no Instituto Pasteur, na França, e em pouco tempo como Diretor Geral de Saúde Pública conseguiu controlar a febre amarela na cidade do Rio de Janeiro, por meio da limpeza de focos de mosquitos vetores e o isolamento de pessoas doentes nos hospitais.
- 04) A Revolta da Vacina foi um motim popular ocorrido entre 10 e 16 de novembro de 1904 na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil e o estopim da rebelião popular foi uma lei que determinava a obrigatoriedade de vacinação contra a peste bubônica.
- 08) O médico Oswaldo Cruz ficou encarregado do saneamento da cidade do Rio de Janeiro, assumindo a Diretoria Geral de Saúde Pública (DGSP) com a intenção de enfrentar a febre amarela, a varíola e a peste bubônica.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**03-** A Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Sobre essa lei e suas atualizações, assinale o que for correto.

- 01) A execução de ações de saúde bucal foi incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde pela Lei nº 14.572 de 2023, sendo de competência da direção nacional do SUS definir as diretrizes e as normas para a estruturação física e organizacional dos serviços de saúde bucal.
- 02) A Lei nº 14.510 de 2022 alterou a Lei orgânica da saúde para autorizar e disciplinar a prática da tele-saúde em todo o território nacional, que se refere a modalidade de prestação de serviços de saúde a distância, por meio da utilização das tecnologias da informação e da comunicação, que envolve, entre outros, a transmissão segura de dados e informações de saúde, por meio de textos, de sons, de imagens ou outras formas adequadas.
- 04) O princípio da organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, foi inserido, entre os princípios do Sistema Único de Saúde pela Lei nº 13.427 de 2017, garantindo, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras.
- 08) O subsistema de atenção à saúde do idoso foi incluído na Lei Orgânica da Saúde pela Lei 13.980 de 2021, o qual prevê ações e serviços de saúde voltados para o atendimento dessa população específica, em todo território nacional, coletiva ou individualmente, tendo em vista suas fragilidades e iniquidades.

**04-** Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde diversos fatores determinantes e condicionantes. Sobre esse assunto, assinale o que for correto.

- 01) Políticas de inclusão social que visem melhores condições de moradia, trabalho e renda da população tem impacto direto na melhoria da sua situação de saúde.
- 02) Políticas sociais relacionadas à atividade física e lazer exercem pouca ou nenhuma influência na situação de saúde da população, pois os fatores individuais e hereditários são mais importantes no processo saúde-doença.
- 04) Políticas públicas de combate à fome e à insegurança alimentar são essenciais para garantia da promoção e proteção da saúde da população.
- 08) A lei orgânica da saúde estabelece como sendo fatores determinantes e condicionantes da saúde, dentre outros, o acesso à cultura, justiça, saneamento básico, bens e serviços essenciais e igualdade étnico-racial.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**05-** A Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS) foi instituída por meio da Resolução nº 588/2018 do Conselho Nacional de Saúde. A PNVS é um documento norteador do planejamento das ações de vigilância em saúde nas três esferas de gestão do SUS, caracterizado pela definição das responsabilidades, princípios, diretrizes e estratégias dessa vigilância. Sobre esse assunto, assinale o que for correto.

- 01) É responsabilidade da União, e compete ao Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Vigilância em Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) executar as ações de vigilância de forma complementar a atuação dos Municípios.
- 02) É responsabilidades dos Municípios, e compete às Secretarias de Saúde, promover, fortalecer e articular a atuação dos Centros de Informação e Assistência Toxicológica no apoio técnico a profissionais de saúde e a pessoas expostas ou intoxicadas por substâncias químicas e medicamentos ou acidentes com animais peçonhentos.
- 04) PNVS deve contribuir para a integralidade na atenção à saúde, o que pressupõe a inserção de ações de vigilância em saúde em todas as instâncias e pontos da Rede de Atenção à Saúde do SUS.
- 08) Detectar, monitorar e responder às emergências em saúde pública, observando o Regulamento Sanitário Internacional, e promover estratégias para implementação, manutenção e fortalecimento das capacidades básicas de vigilância em saúde são diretrizes da PNVS.

**06-** Assinale o que for correto. São diretrizes da Política Nacional de Atenção Hospitalar:

- 01) Garantia da qualidade da atenção hospitalar e segurança do paciente.
- 02) Continuidade do cuidado por meio da articulação do hospital com os demais pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde.
- 04) Modelo de atenção centrado no cuidado ao usuário, de forma multiprofissional e interdisciplinar.
- 08) Financiamento bipartite, articulado entre estados e municípios.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**07-** Assinale as alternativas que apresentam diretrizes da Rede de Atenção às Urgências.

- 01) Centralização do atendimento às urgências com independência das diversas redes de atenção e acesso livre aos serviços de saúde.
- 02) Ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos demandados aos serviços de saúde em todos os pontos de atenção, contemplando a classificação de risco e intervenção adequada e necessária aos diferentes agravos.
- 04) Garantia de implantação de modelo de atenção de caráter multiprofissional, compartilhado por trabalho em equipe, instituído por meio de práticas clínicas cuidadoras e baseado na gestão de linhas de cuidado.
- 08) Articulação interfederativa entre os diversos gestores desenvolvendo atuação solidária, responsável e compartilhada.

**08-** A Rede Cegonha consiste numa rede de cuidados que visa assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento saudáveis. Sobre ela, assinale o que for correto.

- 01) A Rede Cegonha tem como princípios, entre outros: o respeito, a proteção e a realização dos direitos humanos; o respeito à diversidade cultural, étnica e racial; a promoção da equidade e o enfoque de gênero.
- 02) São diretrizes da Rede Cegonha: garantia do acolhimento com avaliação e classificação de risco e vulnerabilidade, ampliação do acesso e melhoria da qualidade do pré-natal; garantia de vinculação da gestante à unidade de referência e ao transporte seguro; garantia das boas práticas e segurança na atenção ao parto e nascimento; garantia da atenção à saúde das crianças de zero a vinte e quatro meses com qualidade e resolutividade; e garantia de acesso às ações do planejamento reprodutivo.
- 04) São objetivos da Rede Cegonha garantir a integralidade do cuidado no pré-natal, na gravidez, na perda gestacional, no parto e, no puerpério, bem como ao recém-nascido e à criança, com foco na resolutividade da atenção primária e da atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e zerar a morbimortalidade materna e infantil.
- 08) A Rede Cegonha deve ser organizada de maneira a possibilitar o provimento contínuo de ações de atenção à saúde materna e infantil para a população de determinado território, mediante a articulação dos distintos pontos de atenção à saúde, do sistema de apoio, do sistema logístico e da governança da rede de atenção à saúde.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**09-** O Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica objetiva propiciar acesso a medicamentos aos usuários com doenças de perfil endêmico e que tenham impacto socioeconômico. Esses medicamentos são gerenciados e disponibilizados aos usuários portadores de doenças que configuram problemas de saúde pública através de Programas Estratégicos, que seguem protocolos e normas específicas. Assinale as alternativas que apresentam apenas problemas de saúde considerados como estratégicos e com cobertura no Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica.

- 01) Doença de chagas.
- 02) Artrite reumatoide.
- 04) Tuberculose.
- 08) Hanseníase.

**10-** Donabedian, na década de 1960, propôs um modelo de avaliação composto por estrutura-processo-resultado. Em relação à avaliação de serviços de saúde proposto por Donabedian, assinale o que for correto.

- 01) Qualidade pode ser medida como o ponto em que o cuidado prestado atinge o equilíbrio mais favorável entre os riscos e benefícios.
- 02) Estrutura correspondem aos insumos, recursos físicos, instalações, equipamentos, mão de obra, manuais de normas/rotinas e procedimentos.
- 04) Resultado corresponde às execuções de ações mediante o uso de protocolos assistenciais, procedimentos, regras, padrões.
- 08) Processo corresponde a avaliação do êxito dos objetivos do cuidado em saúde e satisfação do usuário ou da população.

### QUESTÕES ESPECÍFICAS

**11-** A redução da mortalidade materno-infantil em especial a materna são resultados de diversas ações, tais como: organização dos processos de atenção, acolhimento precoce das gestantes no pré-natal, estratificação de risco e vinculação da gestante, conforme estratificação de risco ao hospital mais adequado para atender o seu parto, bem como o processo de capacitação dos profissionais de saúde. Com relação ao pré-natal de risco habitual, o enfermeiro é um profissional chave na atenção primária. Identifique o que é de responsabilidade legal e ética do enfermeiro realizar, segundo o protocolo do Estado do Paraná, e assinale o que for correto.

- 01) Preenchimento da carteirinha da gestante contendo todas as informações pertinentes e educação em saúde.
- 02) Realizar prescrição conforme protocolo municipal ou estadual de suplementação medicamentosa e exames.
- 04) Prestar assistência de enfermagem à gestante, identificar problemas e implementar o cuidado.
- 08) Ausculta dos batimentos cardíacos.

**12-** Segundo a Fundação Perseu Abramo (2010), uma em cada quatro brasileiras sofre violência no parto e isso tem impacto negativo na qualidade de vida e contribui para a manutenção dos altos índices de mortalidade materna no país, vez que grande parte dessas mortes são causadas por hemorragias e infecções provenientes, na maioria dos casos, de procedimentos obstétricos inadequados, obsoletos, invasivos e violentos. Algumas ações utilizadas para "ajudar" a gestante na hora do parto caiu em desuso e hoje é considerada violência obstétrica, além delas outros procedimentos invasivos entraram nessa lista. Identifique o que atualmente é considerado como violência obstétrica e assinale o que for correto.

- 01) Episiotomia sem necessidade, sem anestesia ou sem informar à mulher.
- 02) Lavagem intestinal.
- 04) Manobra de kristeller.
- 08) infantilizar a mulher, tratá-la como incapaz.

**13-** Os casos de *Near Miss* materno possuem características que podem ser identificadas por meio de condições clínicas, de manejo, laboratoriais, de saúde mental e causas externas. A ocorrência de um critério isolado ou associado pode indicar um caso de *Near Miss* materno. Identifique critérios clínicos para casos de *Near Miss* e assinale o que for correto.

- 01) Dor abdominal intensa.
- 02) Parada cardiorrespiratória.
- 04) Oligúria não responsiva a fluidos e/ou diuréticos.
- 08) Choque.

**14-** A palpação obstétrica e medida da altura uterina (AU) são uma das ações que devem ser realizadas em todas as consultas de pré-natal ou durante o atendimento da gestante depois de uma determinada idade gestacional. Identifique os objetivos dessas ações e assinale o que for correto.

- 01) Diagnosticar os desvios da normalidade a partir da relação entre a altura uterina e a idade gestacional.
- 02) Identificar a posição do feto intra útero (situação, apresentação e fixação fetal à pelve).
- 04) Avaliar o crescimento fetal.
- 08) Diagnosticar mal formação congênita.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**15-** A ausculta de BCF tem por finalidade observar a presença, ritmo, frequência e a normalidade dos batimentos cardíacos fetais. Identifique suas potencialidades e assinale o que for correto.

- 01) Pode ser realizada a partir de 12 semanas com equipamento Sonar Doppler (Doptone) ou a partir de 20 semanas com estetoscópio de Pinard.
- 02) A frequência cardíaca fetal basal normal varia de 110-160 batimentos por minuto.
- 04) A ausculta é de exclusiva função médica.
- 08) É importante atentar a certas situações como por exemplo: é normal observar taquicardia fetal após contração, movimentação fetal ou estímulo mecânico, porém, não é esperado bradicardia ou desaceleração de batimentos após esses eventos.

**16-** Segundo a OMS, a hemorragia pós-parto (HPP) é comumente definida como uma perda de 500 ml de sangue ou mais no período de 24 horas após o parto. A HPP é a principal causa de mortalidade materna em países de baixa renda e a causa primária de quase um quarto de todas as mortes maternas no nível global. A maioria das mortes resultantes da HPP ocorre durante as primeiras 24 horas após o parto: a maioria dessas mortes poderia ser evitada por meio do uso de uterotônicos profiláticos durante a terceira fase do parto e através da gestão adequada em tempo hábil. Nesse período, o enfermeiro pode suspeitar de hemorragia pós-parto diante de alguns indícios. Identifique esses indícios e assinale o que for correto.

- 01) Pirexia e taquicardia.
- 02) Dor de baixa intensidade.
- 04) Subinvolução do útero.
- 08) Lóquios de aspecto vermelho vivo em grande quantidade.

**17-** O terceiro estágio do parto ou período de Greenberg, inicia-se após a dequitação da placenta e estende-se pelas primeiras horas pós-parto. Nesse período é importante o enfermeiro observar, avaliar e controlar sangramento muito comuns no pós-parto imediato e uma das maiores causas de morbimortalidade materna, segundo o Ministério da Saúde. Nesse contexto, o enfermeiro precisa estar atento para evitar a hemorragia e suas complicações. Identifique o que o enfermeiro deve fazer e assinale o que for correto.

- 01) Incentivar a deambulação e realizar enfaixamento abdominal.
- 02) Recomendar suplementação alimentar com ácido fólico nas principais refeições e repouso no leito.
- 04) Avaliar a presença da involução uterina também conhecido como globo de segurança de Pinard e a manutenção da contração uterina.
- 08) Observar após dequitação placentária e a mesma encontra-se íntegra e com todos os cotiledones.

**18-** A OMS recomenda alguns cuidados durante o primeiro estágio do parto normal, essas recomendações se tornaram referência em todo cenário brasileiro e na assistência ao nascimento. Frente a essas recomendações, identifique o que é sugerido de definições do primeiro estágio latente e ativo do trabalho de parto e assinale o que for correto.

- 01) Primeiro estágio latente é um período de tempo caracterizado por contrações uterinas dolorosas e alterações variáveis do colo do útero, incluindo algum grau de apagamento e progressão mais lenta da dilatação até 05 cm para trabalho de parto de nulíparas ou múltíparas.
- 02) Primeiro estágio ativo é um período de tempo caracterizado por contrações uterinas dolorosas regulares, um grau substancial de apagamento cervical e dilatação mais rápida de 05 cm até dilatação completa para trabalhos iniciais e subsequentes.
- 04) Primeiro estágio latente é um período de tempo caracterizado por contrações uterinas não dolorosas e sem alterações variáveis do colo do útero, incluindo algum grau de apagamento e progressão mais lenta da dilatação até 03 cm para trabalho de parto de nulíparas e até 05 cm para múltíparas.
- 08) Primeiro estágio ativo é um período de tempo caracterizado por contrações uterinas dolorosas não regulares, um grau substancial de apagamento cervical e dilatação mais rápida de 05 cm até dilatação completa para trabalhos iniciais e subsequentes.

**19-** Segundo a linha guia de atenção materno infantil (2022), a avaliação e a estratificação de risco devem acontecer na primeira e nas demais consultas do pré-natal, permitindo a orientação e os encaminhamentos adequados em cada momento da gravidez. Deve ser garantido o acesso da gestante aos serviços de atenção especializada à gestação de risco, conforme desenho da Linha de Cuidado Materno Infantil. O cuidado específico deve permanecer até a segunda consulta puerperal, cerca de 30 a 42 dias após o parto, se não houver indicação de ampliação do acompanhamento. Identifique a(s) patologia(s) da estratificação de alto risco e assinale o que for correto.

- 01) Hipertensão arterial crônica.
- 02) Tabagismo com dependência de tabaco elevada (Fagerström: 8 a 10 pontos).
- 04) Hipotireoidismo.
- 08) Hipertireoidismo.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**20-** Um dos principais objetivos das diretrizes encontradas nos protocolos do Ministério da Saúde preza a necessidade de um atendimento de qualidade para o recém-nascido dentro das condições normais de nascimento. Para contemplar as ações humanizadas e integrais no momento do nascimento, sendo seguido por todos os estabelecimentos que realizam partos, independente da sua classificação. Segundo essas diretrizes, assinale o que for correto.

- 01) O atendimento do RN consiste na assistência por profissional devidamente capacitado em reanimação neonatal, médico (preferencialmente pediatra ou neonatal) ou profissional de enfermagem (preferencialmente enfermeiro obstetra ou neonatal).
- 02) Para todos os RNs proceder ao clameamento do cordão umbilical imediatamente após o nascimento.
- 04) Para o RN a termo com ritmo respiratório normal, tônus normal e sem líquido meconial, recomenda-se assegurar o contato pele a pele imediato e contínuo, colocando o RN sobre o abdômen ou tórax da mãe de acordo com sua vontade.
- 08) Mães que apresentarem bico do seio plano ou invertido não devem amamentar logo na primeira hora de vida do RN, aguardando assim a compra de um bico intermediário.

**21-** Manter a temperatura adequada ao nascimento, no alojamento conjunto e na unidade neonatal, implica em diminuição de risco de morbidade ao recém-nascido. Quanto à hipotermia neonatal, assinale o que for correto.

- 01) Atinge, especialmente, os recém-nascidos pré-termo.
- 02) A escassez de tecido subcutâneo é um fator que provoca hipotermia.
- 04) Idade gestacional e pesos menores são fatores de risco para hipotermia.
- 08) As principais repercussões clínicas da hipotermia no recém-nascido são o maior consumo de oxigênio e hipoglicemia.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**22-** A importância da promoção do aleitamento materno está relacionada às vantagens de saúde, econômicas e ambientais de curto e longo prazo para crianças, mulheres e sociedade. Com relação ao aleitamento materno, assinale o que for correto.

- 01) Reduz a incidência e mortalidade infantil associada à diarreia.
- 02) Reduz infecções graves durante o primeiro ano de vida da criança e o risco de doença respiratória.
- 04) Reduz o risco de perda de sangue no pós-parto.
- 08) Traz como benefício o aumento do intervalo interpartal.

**23-** O período puerperal é considerado uma fase na qual ocorrem modificações biológicas, emocionais e sociais. Com base no puerpério, assinale o que for correto.

- 01) Segundo o Ministério da Saúde, refere-se ao período que tem início imediatamente após o parto e dura, em média, seis semanas.
- 02) O *baby-blues* é o transtorno mental de maior prevalência durante o período puerperal.
- 04) Período oportuno para assistência à mãe, filho e família.
- 08) A consulta puerperal deve ser realizada pela equipe multiprofissional, não sendo necessário o plano de cuidado materno.

**24-** Os problemas mamários estão dentre os principais fatores que levam a ocorrência do desmame precoce. Sobre as intercorrências relacionadas à mama, assinale o que for correto.

- 01) As fissuras mamilares são comuns e não causam dor na amamentação.
- 02) O ingurgitamento mamário leva à obstrução do fluxo de leite.
- 04) A fissura mamilar é definida como solução de continuidade linear, localizada no mamilo ou área de junção areolomamilar.
- 08) A mastite é um processo inflamatório ou infeccioso que pode ocorrer na mama habitualmente a partir da segunda semana após o parto.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**25-** Considerando a incorporação das boas práticas de atenção ao parto e ao nascimento e a consequente redução das intervenções desnecessárias constituídas em recomendações da Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde, assinale o que for correto.

- 01) As práticas de atenção ao parto normal então estabelecidas foram classificadas em categorias relacionadas à utilidade, à eficácia e ao risco.
- 02) O fomento à autonomia e ao protagonismo da mulher e a medicalização da saúde reforçam as boas práticas de atenção ao parto.
- 04) As boas práticas de atenção integram o cuidado singular e multidimensional, capazes de transcender o caráter biológico.
- 08) Tecnologias leves de cuidado em saúde são exemplos de boas práticas no cenário obstétrico.

**26-** Quanto à fisiologia da transição e clameamento do cordão umbilical, assinale o que for correto.

- 01) Com o clameamento do cordão umbilical ocorre um aumento abrupto na resistência vascular sistêmica pela interrupção do fluxo placentário.
- 02) No recém-nascido a termo e prematuros tardios, o clameamento oportuno/tardio facilita a transição cardiorrespiratória após o parto, sendo benéfico com relação ao aumento da concentração de hemoglobina nas primeiras 24 horas.
- 04) Nos prematuros <34 semanas, o clameamento oportuno/tardio está associado a diminuição da hemorragia peri-intraventricular de qualquer grau, além de melhor a adaptação cardiorrespiratória.
- 08) O sangue passa do feto para a placenta por meio das artérias umbilicais que se dilatam rapidamente após o nascimento, reduzindo o fluxo sanguíneo do recém-nascido em direção à placenta.

**27-** A infecção puerperal está entre as quatro principais complicações associadas ao parto e ao puerpério, sendo causa importante de morbimortalidade no mundo, responsável por 10% das mortes maternas globais. Com base na infecção puerperal, assinale o que for correto.

- 01) Os principais sinais e sintomas são hipotermia e dor abdominal.
- 02) A ocorrência de episiotomia no parto vaginal dobra o risco de desenvolvimento de infecção puerperal.
- 04) O parto cesáreo é o principal fator predisponente.
- 08) A antibioticoprofilaxia precoce favorece a infecção puerperal.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**28-** Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, o diabetes mellitus gestacional (DMG) é definido pela presença de hiperglicemia detectada pela primeira vez durante a gravidez, com níveis glicêmicos sanguíneos que não atingem os critérios diagnósticos para diabetes mellitus. Entre os fatores de risco e complicações causadas pelo DMG, assinale o que for correto.

- 01) Hiperglicemia neonatal.
- 02) Macrossomia fetal.
- 04) Hipotensão.
- 08) Polidrâmnio.

**29-** Sobre as principais manifestações da hipoglicemia em recém-nascido prematuro sintomático, assinale o que for correto.

- 01) Letargia, apneia e convulsão.
- 02) Choro anormal, glicemia maior que 60 mg/dl e hipotermia.
- 04) Irritabilidade e choro anormal.
- 08) Tremores e glicemia menor que 60 mg/dl.

**30-** Sobre a Hemorragia Pós-Parto (HPP), assinale o que for correto.

- 01) A atonia uterina é a principal causa de HPP.
- 02) A principal estratégia de prevenção da HPP é o uso universal da ocitocina pós-parto.
- 04) A principal causa de HPP é a coagulopatia.
- 08) O tratamento da HPP deve ser rápido e não baseado na causa específica da hemorragia.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES