

INSTRUÇÕES QUANTO AO PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS

1. A prova é elaborada com questões de alternativas múltiplas;
2. Cada questão contém **4 (quatro) alternativas**, indicadas com os números **01, 02, 04 e 08**;
3. O valor a ser assinalado no cartão de respostas será a soma dos números correspondentes às alternativas corretas. Cada questão pode ter uma, duas, três ou quatro alternativas corretas;
4. No local próprio do cartão de respostas, deve ser assinalado o valor numérico do somatório encontrado, obrigatoriamente com dois algarismos. Em questões com somatório entre os intervalos 01 e 09, o algarismo zero da casa decimal deve ser preenchido (exemplo: 06);
5. A atribuição de pontos só será feita quando o valor numérico assinalado incluir pelo menos **uma alternativa correta** e **nenhuma alternativa errada**. Portanto, a pontuação integral ou parcial de uma questão só será computada se o somatório apresentado **não incluir alternativa(s) errada(s)**.

Suponha a questão hipotética número 65, representada abaixo. Você identificou duas alternativas corretas na questão, a saber:

65 – Enunciado da questão, assinale o que for correto.

- 01) **Alternativa correta.** ✓
02) Alternativa errada.
04) Alternativa errada.
08) **Alternativa correta.** ✓

09

A soma das duas alternativas corretas (**01 + 08**) será igual a **09**.

No **Cartão de Respostas**, o campo referente à questão 65 deve ser **preenchido da maneira indicada ao lado**.

CARTÃO DE RESPOSTAS

65	
<input checked="" type="checkbox"/>	0
<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
<input type="checkbox"/>	4
<input type="checkbox"/>	5
<input type="checkbox"/>	6
<input type="checkbox"/>	7
<input type="checkbox"/>	8
<input checked="" type="checkbox"/>	



Agora suponha a questão hipotética número 70, representada abaixo. Você identificou três alternativas corretas na questão, a saber:

70 – Enunciado da questão, assinale o que for correto.

- 01) Alternativa errada.
02) **Alternativa correta.** ✓
04) **Alternativa correta.** ✓
08) **Alternativa correta.** ✓

14

A soma das três alternativas corretas (**02 + 04 + 08**) será igual a **14**.

No **Cartão de Respostas**, o campo referente à questão 70 deve ser **preenchido da maneira indicada ao lado**.

CARTÃO DE RESPOSTAS

70	
<input type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	5
<input type="checkbox"/>	6
<input type="checkbox"/>	7
<input type="checkbox"/>	8
<input type="checkbox"/>	9



QUESTÕES REFERENTES A POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE E MODELOS DE ATENÇÃO À SAÚDE

01- Sobre os principais marcos da história das políticas públicas de saúde no Brasil, assinale o que for correto.

- 01) A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) foi instituída na Constituição Federal de 1988, que consagrou o direito à saúde como um direito universal e garantido a todos os cidadãos brasileiros.
- 02) A Lei Orgânica da Saúde, regulamentada pela Lei nº 8.080/1990, estabelece os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).
- 04) O Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), estabelecido em 1942, foi criado como um programa de prevenção e controle de doenças crônicas não transmissíveis no Brasil.
- 08) O Programa Saúde da Família foi implementado pela primeira vez em 1998 com o objetivo de oferecer cuidados de saúde primários em áreas urbanas e rurais, focado na prevenção de doenças crônicas e na promoção da saúde mental.

02- Considerando os conceitos sobre o processo saúde-doença e os determinantes sociais de saúde, assinale o que for correto.

- 01) Os determinantes sociais de saúde referem-se às condições socioeconômicas, culturais e ambientais que influenciam a saúde das pessoas.
- 02) A relação entre saúde e doença é estática, uma vez que fatores biológicos determinam de forma definitiva a condição de saúde de um indivíduo.
- 04) A teoria da determinação social da saúde considera que a saúde é influenciada por um conjunto complexo de fatores sociais, econômicos e políticos.
- 08) O modelo biomédico de saúde enfoca principalmente as causas biológicas da doença, desconsiderando fatores sociais e ambientais.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

03- Acerca dos diferentes modelos de atenção à saúde implementados no Brasil, assinale o que for correto.

- 01) No modelo de assistencialismo médico, o acesso é direcionado a uma população específica, com foco em práticas de atenção voltadas predominantemente para as ações curativas.
- 02) No sanitarismo, o financiamento é público estatal, com o processo saúde-doença baseado na perspectiva microbiológica e em medidas coletivas de saúde pública.
- 04) No modelo de atenção básica em saúde, as práticas de atenção à saúde são multiprofissionais, orientadas pela integralidade e proteção social universal.
- 08) O modelo preconizado atualmente é o de atenção básica em saúde, embora os demais modelos ainda possam influenciar a organização de programas e práticas de atenção à saúde.

04- Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) e sua estrutura de gestão e financiamento, assinale o que for correto.

- 01) A Lei nº 8.080/1990 estabelece que a gestão do SUS deve ser realizada exclusivamente pelos gestores municipais, sem a necessidade de coordenação com os níveis estadual e federal.
- 02) O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) é uma ferramenta fundamental no SUS para a gestão e monitoramento das atividades da atenção básica, integrando dados de saúde e gerenciais.
- 04) O SUS adota o modelo de financiamento tripartite, envolvendo a alocação de recursos financeiros por parte dos níveis federal, estadual e municipal, com base em critérios de população e necessidades de saúde.
- 08) O SUS permite a implementação de políticas de saúde específicas, como programas de saúde da família e vigilância em saúde, sem necessidade de alinhamento com as diretrizes nacionais e estaduais.

05- Acerca dos princípios orientadores da Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), assinale o que for correto.

- 01) A centralização dos serviços hospitalares em grandes centros urbanos é uma diretriz da PNHOSP para facilitar o acesso a serviços de alta complexidade.
- 02) A eficiência e eficácia na gestão dos recursos são princípios que orientam a administração hospitalar para otimizar o uso dos recursos disponíveis.
- 04) A Política Nacional de Atenção Hospitalar prioriza a hospitalização de longa permanência como forma de atendimento preferencial.
- 08) A integralidade da atenção é um princípio que visa garantir um atendimento abrangente ao paciente, considerando todas as suas necessidades de saúde.

06- Sobre as Redes de Atenção à Saúde no Brasil, assinale o que for correto.

- 01) As Redes de Atenção à Saúde são estruturadas para promover a integração e coordenação entre diferentes níveis de atenção, desde a atenção primária até a atenção especializada e hospitalar, com o objetivo de garantir a continuidade do cuidado ao longo do percurso de saúde do indivíduo.
- 02) A regionalização das Redes de Atenção à Saúde permite que os serviços sejam organizados de acordo com a demanda e as características epidemiológicas de cada região, facilitando a gestão e a cobertura dos serviços de saúde.
- 04) A integração dos serviços de saúde nas Redes de Atenção é essencial para evitar duplicidade de esforços e promover uma abordagem centrada no paciente, que considera suas necessidades ao longo de todo o percurso de cuidado.
- 08) As Redes de Atenção à Saúde têm como um de seus princípios a centralização das decisões e a padronização rigorosa dos protocolos de atendimento em todo o território nacional, assegurando uniformidade na prestação dos serviços de saúde.

07- Considerando os componentes da vigilância à saúde no Brasil, assinale o que for correto.

- 01) A vigilância epidemiológica é responsável pelo monitoramento de doenças transmissíveis e crônicas.
- 02) A vigilância sanitária regula a segurança de alimentos, medicamentos e serviços de saúde.
- 04) A vigilância do mercado de trabalho é parte integrante da vigilância à saúde.
- 08) A vigilância ambiental monitora fatores do ambiente que podem afetar a saúde da população.

08- Sobre os programas estratégicos de atenção à saúde desenvolvidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), assinale o que for correto.

- 01) O Programa Saúde da Família (PSF) visa a ampliação da cobertura de atenção básica no Brasil.
- 02) O Programa Nacional de Imunizações (PNI) é responsável pela coordenação e sistematização das ações de vacinação no país.
- 04) O Programa de Controle do Tabagismo busca reduzir a prevalência de fumantes e prevenir doenças relacionadas ao tabaco.
- 08) O Programa de Assistência Domiciliar (PAD) oferece cuidados de saúde na residência do paciente, promovendo a desospitalização.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

09- Sobre a avaliação em saúde, assinale o que for correto.

- 01) A avaliação de impacto em saúde concentra-se exclusivamente na análise de dados financeiros do programa, sem considerar os efeitos na saúde da população.
- 02) A avaliação em saúde não é necessária para a tomada de decisões gerenciais, pois os gestores podem basear suas decisões apenas na experiência e na percepção subjetiva dos resultados dos programas.
- 04) A avaliação em saúde pode ser classificada em avaliação de processos, resultados e impacto, sendo a avaliação de processos focada em como as atividades do programa são implementadas e se estão sendo realizadas conforme o planejado.
- 08) A avaliação de resultados busca medir a efetividade das intervenções em termos de melhoria dos indicadores de saúde e alcançando os objetivos específicos estabelecidos para o programa.

10- Considerando os elementos fundamentais do planejamento estratégico em saúde, assinale o que for correto.

- 01) O diagnóstico situacional é essencial para entender a realidade de saúde da população e orientar o planejamento.
- 02) A definição de metas e objetivos é crucial para estabelecer os resultados esperados e direcionar as ações.
- 04) O monitoramento e avaliação permitem acompanhar a implementação e os resultados do plano de saúde.
- 08) A flexibilidade dos recursos financeiros é o principal fator para o sucesso do planejamento estratégico em saúde.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

QUESTÕES ESPECÍFICAS

11- A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a análise dos casos de morbidade materna severa, ou *Near Miss* materno, como um complemento às investigações sobre mortes maternas. Isso se deve ao fato de que a incidência de casos de *Near Miss* é mais alta e os fatores preditivos para ambos os desfechos são semelhantes. Considerando que as taxas de mortalidade materna no Brasil têm permanecido estáveis, apesar dos compromissos assumidos na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015, a OMS propõe a criação de um sistema nacional de vigilância para casos de *Near Miss* materno. Identifique critérios para análise de casos e assinale o que for correto.

- 01) Hipoperfusão grave (lactato >5mmol/h ou >45 mg/dl).
- 02) Icterícia na ausência de pré eclampsia.
- 04) Diálise para insuficiência renal aguda.
- 08) Acidente Vascular encefálico.

12- Existem alguns conceitos que permitem compreender a diversidade sexual e qualificar o cuidado de pessoas LGBTI+ (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis, intersexo e demais denominações). Dentro das ações desenvolvidas pelo SUS para essa inclusão está o pré-natal de pessoas transgênero. Quanto à definição e exemplos desses conceitos, assinale o que for correto.

- 01) A orientação sexual se refere a com quem a pessoa tem relações afetivas ou/e sexuais. A saber, as orientações mais conhecidas são: heterossexual, bissexual, homossexual e pansexual.
- 02) A identidade de gênero é autodeclarada e se refere à compreensão de como a pessoa se identifica para o mundo. As identidades mais conhecidas são: cisgênero e transgênero.
- 04) No que se refere à identidade de gênero transgênero, temos comumente mulheres trans e travesti. A única diferença entre essas duas identidades é sobre a realização ou não da cirurgia de resignação sexual. Mulheres trans realizam cirurgia, travestis não realizam cirurgia.
- 08) O sexo biológico é um conjunto de características biológicas que levam em conta informações cromossômicas, mas que deixa de lado as informações fisiológicas, sobre a capacidade reprodutiva e aspectos hormonais. O sexo biológico geralmente se divide em: feminino, masculino e intersexo.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

13- A Organização Mundial da Saúde (OMS) desenvolveu uma classificação das práticas comuns na condução do parto normal, orientando para o que deve e o que não deve ser feito no processo do parto. (MS, 2022). Esta classificação foi baseada em evidências científicas concluídas através de pesquisas feitas no mundo todo. A categoria "A" traz práticas úteis e que devem ser estimuladas. Sobre essas práticas, assinale o que for correto.

- 01) Avaliação do risco gestacional durante o pré-natal, reavaliado a cada contato com o sistema de saúde e no momento do primeiro contato com o profissional da saúde durante e ao longo do trabalho de parto.
- 02) Manter a paciente em jejum, pois se necessário qualquer outro tipo de procedimento a mesma estará preparada para realizá-lo.
- 04) Manter a paciente deitada em leito para melhor possibilidade de intervenções no caso de distocia.
- 08) Métodos não invasivos e não farmacológicos de alívio da dor, como massagem e técnicas de relaxamento, durante o trabalho de parto.

14- Desde o final da década de 1980, o Brasil tem implementado várias iniciativas para aprimorar a cobertura e a qualidade das informações sobre mortalidade materna. Entre essas ações, destacam-se a criação e a estruturação de comitês de mortalidade materna e a institucionalização da Vigilância do Óbito Materno. Simultaneamente, os governos federal, estaduais e municipais têm promovido políticas públicas destinadas a expandir e melhorar a atenção à saúde da mulher, o que tem contribuído para a redução da taxa de mortalidade materna, especialmente nos óbitos por causas obstétricas diretas. O enfermeiro tem um papel fundamental nessas políticas e as ações estão centradas em:

- 01) Realizar educação em saúde durante todas as consultas de enfermagem e o preenchimento correto do cartão das gestantes.
- 02) Prescrever medicamentos, suplementação e exames de acordo com cada protocolo municipal e/ou estadual.
- 04) Identificar os problemas decorrentes no pré-natal, encaminhar a gestante para consulta com profissional médico se necessário e prestar assistência integral a gestante dentro da equipe multiprofissional.
- 08) Realizar o preenchimento das curvas de altura uterina/idade gestacional e gráfico de acompanhamento nutricional.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

15- Além dos exames realizados durante o pré-natal, a gestante deve receber várias vacinas, que têm o objetivo de fortalecer seu sistema imunológico e proteger a saúde do bebê. Através da imunização, os anticorpos da mãe são transferidos para o bebê tanto pela placenta quanto pelo leite materno após o nascimento. A Cader-neta da Gestante, fornecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), oferece informações sobre as vacinas recomendadas durante a gravidez, testes rápidos e exames para detectar alterações, cuidados essenciais, orientações sobre o parto, direitos da gestante, dicas úteis, e o pré-natal do pai ou parceiro, entre outras referências importantes. Entre as vacinas recomendadas para gestantes e disponíveis no SUS, estão:

- 01) Vacina dupla adulto (dT).
- 02) Vacina dTpa e Hepatite B.
- 04) Vacina Influenza (gripe) e Covid 19.
- 08) Tríplice Viral.

16- A Linha de Cuidado Materno Infantil da Secretaria de Estado da Saúde tem como finalidade a organização da atenção e assistência nas ações do pré-natal, parto, puerpério e o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças, em especial no seu primeiro ano de vida. Tendo em vista as mudanças ocorridas no perfil das gestantes, desde a implantação da rede materno-infantil, identificou-se a necessidade de revisar e atualizar os critérios para estratificação de risco das gestantes, a fim de qualificar a atenção ao pré-natal em todo o Estado do Paraná. (SESA,2024). Sobre a estratificação de risco intermediário, assinale o que for correto.

- 01) Idade <15 anos ou >40 anos.
- 02) Hipertireoidismo.
- 04) Etilismo com indicativo de dependência (T-ACE: 2 pontos ou mais).
- 08) Dependência de drogas ilícitas.

17- A auscultação dos batimentos cardíacos fetais (BCF) é um procedimento essencial para avaliar a vitalidade do feto durante o trabalho de parto, sendo os sons cardíacos a única evidência clínica objetiva do funcionamento do sistema circulatório do bebê (MONTENEGRO; REZENDE FILHO, 2017). Dada a importância dessa avaliação, o National Collaborating Centre for Women's and Children's Health (NICE) recomenda que.

- 01) A ausculta cardíaca fetal pode ser realizada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e odontólogos.
- 02) Pode ser realizada a partir de aproximadamente 12 semanas com equipamento Sonar Doppler (Doptone) ou a partir de aproximadamente 20 semanas com estetoscópio de Pinard.
- 04) A frequência cardíaca fetal normal varia de 120-160 batimentos por minuto.
- 08) Deve-se controlar o pulso da gestante para certificar-se de que os batimentos ouvidos são os do feto, já que as frequências são diferentes, e contar os batimentos cardíacos fetais por um minuto, observando sua frequência e ritmo e anotar.

18- A hemorragia pós-parto (HPP) é comumente definida como uma perda de 500 ml de sangue ou mais no período de 24 horas após o parto. A HPP é a principal causa de mortalidade materna em países de baixa renda e a causa primária de quase um quarto de todas as mortes maternas no nível global. A maioria das mortes resultantes da HPP ocorre durante as primeiras 24 horas após o parto: a maioria dessas mortes poderia ser evitada por meio do uso de uterotônicos profiláticos durante a terceira fase do parto e através da gestão adequada em tempo hábil. (Fiocruz, 2024). Nesse período, o enfermeiro atuará como membro da equipe multiprofissional. Identifique recomendações para prevenção de HPP e assinale o que for correto.

- 01) O uso de uterotônicos para a prevenção da HPP durante a terceira fase do parto é recomendado para todos os partos.
- 02) A ocitocina (10 UI, IV/IM) é o fármaco uterotônico recomendado para a prevenção da HPP.
- 04) A retirada manual da placenta realizando tração não controlada em cordão umbilical.
- 08) A avaliação do tônus uterino abdominal pós-parto para a identificação precoce da atonia uterina é recomendada para todas as mulheres.

19- Entende-se por violência obstétrica a apropriação do corpo e dos processos reprodutivos das mulheres por profissional de saúde que se expresse por meio de relações desumanizadoras, de abuso de medicalização e de patologização dos processos naturais, resultando em perda de autonomia e capacidade de decidir livremente sobre seu corpo e sexualidade, impactando negativamente na qualidade de vida das mulheres. (Fiocruz, 2023). São consideradas violência obstétrica:

- 01) Falta de confidencialidade.
- 02) Cuidado negligente durante o parto levando à complicações evitáveis e situações ameaçadoras da vida.
- 04) Omitir informações sobre os procedimentos realizados e não negociar com a paciente a realização desses procedimentos.
- 08) Abandono, negligência ou recusa de assistência.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

20- A sífilis afeta um milhão de gestantes por ano em todo o mundo, levando a mais de 300 mil mortes fetais e neonatais e colocando em risco de morte prematura mais de 200 mil crianças. Em 2021, o percentual de tratamento adequado da sífilis na gestação foi de 81,4%; entretanto, para eliminar a sífilis congênita, faz-se necessário envidar esforços para alcançar 95% ou mais de cobertura de tratamento materno adequado, de acordo com as recomendações da Organização Pan-Americana da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (Opas/OMS). O enfermeiro apresenta um papel fundamental na realização dos testes rápidos e no aconselhamento após testagem. Sobre o tratamento de sífilis recente (menos de 2 anos de evolução), sífilis primária, secundária e latente recente, assinale o que for correto.

- 01) Penicilina G benzatina 2,4 milhões UI, IM, dose única (1,2 milhões UI em cada glúteo).
- 02) Penicilina G benzatina 4,2 milhões UI, IM, dose única (2,1 milhões UI em cada glúteo).
- 04) As parcerias sexuais de gestantes com sífilis podem estar infectadas, mesmo apresentando testes imunológicos não reagentes; portanto, devem ser tratadas presumivelmente com apenas uma dose de penicilina benzatina IM (2.400.000 UI).
- 08) As parcerias sexuais de gestantes com sífilis podem estar infectadas, mesmo apresentando testes imunológicos não reagentes; portanto, devem ser tratadas presumivelmente com apenas uma dose de penicilina benzatina IM (4.200.000 UI).

21- O Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) foi instituído pela Portaria GM/MS nº 822/2001, atualizada pela Portaria de Consolidação GM/MS nº 5/2017, considerado de grande importância nacional. Com base na triagem neonatal, assinale o que for correto.

- 01) Tem como objetivo identificar e tratar recém-nascidos portadores de doenças congênitas pouco sintomáticas no período neonatal.
- 02) O Ministério da Saúde por meio do manual Triagem Neonatal Biológica e da Nota informativa CGSH/DAET/SAES/MS nº 4/2020, determina que a coleta do teste do pezinho deve ser realizada, preferencialmente, entre o 2º e 7º dia de vida do recém-nascido.
- 04) A fenilcetonúria pode ser diagnosticada na triagem neonatal com o teste do pezinho, sendo esta uma doença genética causada pela deficiência ou ausência da enzima fenilalanina-hidroxilase, que afeta o desenvolvimento neurológico da criança.
- 08) Consiste na pesquisa de doenças a partir de uma amostra de sangue do recém-nascido, permitindo que ele seja tratado em tempo oportuno, evitando sequelas e até mesmo a morte.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

22- Náuseas e vômitos durante a gravidez são condições que afetam a saúde da mulher grávida e de seu feto, principalmente quando persistentes e/ou graves. Sobre a hiperêmese gravídica, assinale o que for correto.

- 01) Pode levar a distúrbios hidroeletrólíticos, alterações nutricionais e metabólicas.
- 02) Pode levar a cetonúria e perda de mais de 5% do peso corporal, trazendo risco para a vida materna e fetal.
- 04) Associa-se com morbidade materna e fetal grave, como a encefalopatia de Wernicke e restrição de crescimento fetal.
- 08) É uma forma grave de náuseas e vômitos na gravidez, que afeta uma grande porcentagem das gestantes e requer hospitalização.

23- Conforme o Manual de Gestação de Alto Risco elaborado pelo Ministério da Saúde (2022), o citomegalovírus é um herpesvírus tipo 5 que apresenta grande relevância no período gravídico-puerperal devido sua capacidade de gerar disrupções fetais. Com base na infecção por citomegalovírus, assinale o que for correto.

- 01) Infecções no segundo e terceiro trimestre estão associadas a sequelas neurológicas graves no neonato.
- 02) Na gestação, pode gerar abortamento e malformações.
- 04) A soroconversão no primeiro trimestre gestacional não gera sequelas neurológicas no neonato.
- 08) A transmissão vertical pode ocorrer por via transplacentária e por secreções durante o parto.

24- A gravidez ectópica é definida, segundo o Ministério da Saúde (2022), quando a implantação e o desenvolvimento do blastocisto ocorrem fora da grande cavidade corporal do útero. Entre os principais fatores de risco para gravidez ectópica, assinale o que for correto.

- 01) Doença inflamatória pélvica.
- 02) Endometriose.
- 04) Multíparas.
- 08) Obesidade.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

25- No Brasil, o movimento pela humanização do parto foi inspirado pela prática das parteiras tradicionais na década de 1970. Já na década de 1980 foram criados grupos ofertando cuidado humanizado à gestação e parto, propondo mudanças de práticas. De acordo com o termo "humanização do parto", assinale o que for correto.

- 01) Um importante marco do movimento de humanização do parto foi a fundação da Rede de Humanização do Parto e Nascimento (Rehuna).
- 02) Um dos significados para humanização do parto refere-se à busca por uma assistência que seja baseada em evidências.
- 04) O termo humanização do parto também é utilizado como uma reivindicação dos direitos das mulheres.
- 08) A humanização do parto refere-se a legitimidade epidemiológica com um impacto na saúde da coletividade.

26- Sobre o início precoce da amamentação na primeira hora de vida, assinale o que for correto.

- 01) Diminui o risco de mortalidade neonatal, mas não interfere no risco de infecções.
- 02) Diminui o risco de infecções e mortalidade neonatal.
- 04) É fundamental para a sobrevivência do recém-nascido e estabelecimento da amamentação a longo prazo.
- 08) Não diminui o risco de infecções e mortalidade neonatal.

27- A saúde reprodutiva é um direito humano e implica a capacidade de procriar e a liberdade de decidir quando e com que espaçamento se deseja ter filhos. Com base no exposto e nos métodos contraceptivos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, assinale o que for correto.

- 01) Os métodos de barreira compreendem o preservativo masculino, feminino e diafragma.
- 02) A contracepção definitiva, vasectomia e laqueadura são indicados em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 21 anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos.
- 04) Os anticoncepcionais combinados são métodos pouco comuns e com maior número de contraindicações.
- 08) A contracepção de longa duração reversível compreende o implante subdérmico; DIU hormonal e DIU de cobre.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

28- De acordo com o Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria (2022), assinale o que for correto sobre o clameamento do cordão umbilical no recém-nascido (RN) ≥ 34 semanas de gestação e com boa vitalidade ao nascer.

- 01) Recomenda-se clampear o cordão umbilical, no mínimo, 60 segundos após o nascimento.
- 02) O clameamento do cordão umbilical entre 1 e 3 minutos facilita a transição cardiorrespiratória após o parto e diminui o risco de policitemia.
- 04) Recomenda-se clampear o cordão umbilical, no mínimo, 90 segundos após o nascimento.
- 08) O clameamento do cordão umbilical entre 1 e 3 minutos aumenta a concentração de ferritina nos primeiros 3 a 6 meses de vida da criança.

29- O Plano de Parto surgiu no final dos anos 1970, introduzido por educadores pré-natais, com o objetivo de facilitar a comunicação entre gestantes e profissionais de saúde, além de encorajar tomadas de decisão informadas. Com relação ao Plano de Parto, assinale o que for correto.

- 01) Trata-se de um documento escrito, de caráter legal, onde as gestantes expressam antecipadamente suas preferências referentes ao cuidado que gostariam de receber durante o trabalho de parto e parto.
- 02) O Plano de Parto tem se tornado cada vez mais comum nos países ocidentais em defesa da autonomia das mulheres durante o parto.
- 04) É a primeira de uma série de recomendações da Organização Mundial da Saúde denominada Boas Práticas de Atenção ao Parto e Nascimento.
- 08) Recomenda-se que o Plano de Parto seja realizado após a gestante ser esclarecida sobre a fisiologia do trabalho de parto e parto.

30- Quanto à colonização materna por estreptococo do grupo B, assinale o que for correto.

- 01) A transmissão vertical pode ocorrer intraútero, por via ascendente, como consequência da ruptura prolongada das membranas.
- 02) A colonização materna no momento do parto consiste em fator de risco para transmissão vertical desta bactéria e desenvolvimento da doença estreptocócica neonatal.
- 04) As estratégias de rastreamento de gestantes colonizadas pelo estreptococo do grupo B incluem a identificação dos fatores de risco e a cultura de material vaginal e endoanal entre a 36ª e 37ª semana de gestação.
- 08) Entre os recém-nascidos que desenvolvem a doença estreptocócica de início precoce, são raros os casos que evoluem para óbito.